

3.1 动物感染创面的 pH 值 实验兔第 1、2 组接种金黄色葡萄球菌的创面平均 pH 值为 6.2, 第 3、4 组接种大肠杆菌的创面平均 pH 值为 6.5, 第 5、6 组接种绿脓杆菌的创面平均 pH 值为 8.2。

3.2 普济药膏对动物感染创面 pH 值的影响 实验组感染创面敷贴普济药膏 4 次, 全部创面的 pH 值均转为 7~7.5, 其第 1、3、5 组 pH 值分别平均为 7.2、7.3、7.4。对照组敷贴凡士林油纱布 4 次, 创面的 pH 值变化不大, 第 2、4、6 组 pH 值分别平均为 6.7、6.8、8.1。第 1、3、5 组与第 2、4、6 组创面 pH 值的转变对比, 其 P 值均 <0.01 。

3.3 普济药膏对动物感染创面愈合时间的影响 实验第 1、3、5 组创面平均愈合分别为 36.5 天、35.4 天、35.8 天, 与对照第 2、4、6 组的 49.3 天、48.7 天、50.1 天对比, 其愈合时间明显加快, P 值均 <0.01 。

讨 论

本文所用普济药膏, 其组方成份黄连、大

黄、煅龙骨能清热解毒、收湿消肿, 紫草、丹皮、血竭能活血化瘀、去腐脱痂, 川贝母、鸡内金、植物油能生肌敛创、润肤长皮, 玄胡索、冰片能止痛。通过 628 例临床对照观察和实验研究, 结果表明, 普济药膏能迅速减少、停止 II° 烧、烫伤创面渗液, 消除水肿, 加快创面愈合, 具有类似异体植皮的保护创面作用。能较快溶软, 脱除 III° 烧、烫伤焦痂, 有优于切痂术的脱痂效果。据有关资料报道, 金黄色葡萄球菌因分解糖类产酸, 会使创面 pH 值降至 6.7 以下; 而绿脓杆菌因分解氨基酸产氨, 会使创面 pH 值升至 8.0 以上; 只有使其 pH 值调至 7~7.5 时, 创面含菌量最少, 感染最轻, 愈合最快^①。普济药膏能将动物感染创面 pH 值全部转为中性, 具有显著的杀(抑)菌作用, 可提高植皮成活率。

参 考 文 献

1. 姜会庆. 两年来我国军内烧伤治疗的概况. 中华整形烧伤外科杂志 1992; 8(4): 315.

(收稿: 1993—11—22 修回: 1994—02—19)

· 读者 · 作者 · 编者 ·

对行气整肠汤治疗结肠曲综合征疗效的验证

赵树侠

读了贵刊 1992 年第 8 期第 493 页“行气整肠汤治疗结肠曲综合征”一文后, 笔者自 1992 年 10 月~1993 年 12 月在临床使用此法治疗结肠曲综合征 2 例, 取得了满意效果。现报告如下。

例 1 患者女, 72 岁。因左上腹胀满胀痛, 夜间加重 2 周, 于 1992 年 11 月 10 日就诊。患者发病前有明显心情不畅史, 发病后曾用氨基苄青霉素每日 5 g 静脉滴注, 连续 10 天无效, 腹胀明显加重, 夜不能寐, 伴有食少纳呆。X 线腹部透视可见结肠脾曲处有明显气体积聚。实验室检查未见异常。中医辨证为胃肠气滞。治疗用药为行气整肠汤原方: 木香、厚朴、大腹皮、槟榔片、莱菔子、枳壳各 30 g, 沉香 15 g。每日 1 剂, 水煎服。3 天后左上腹胀满胀痛明显减轻, 饮食恢复正常。服药第 7 天症状全部消失, X 线腹部透视无异常。嘱其服药 5 剂以巩固疗效。随

访 1 年未复发。

例 2 患者女, 36 岁, 左上腹胀满胀痛, 并向左腰部放射 1 周, 于 1993 年 6 月 15 日就诊。患者于 1 周前因心情不畅后自觉左上腹部胀满胀痛, 并向左腰部放射。曾口服胃舒平、静脉滴注庆大霉素 24 万 u, 每日 1 次, 治疗 4 天无效, 腹部胀痛加重。实验室检查排除各脏器实质性病变, X 线腹部透视可见结肠脾曲有少量气体积聚。中医辨证为胃肠气滞。治疗用行气整肠汤原方水煎服。1 天后症状明显减轻, 3 天后症状消失, 腹部透视无异常。嘱其继服 4 剂以巩固疗效。随访 6 个月未复发。

体 会 本病目前西医无特效疗法, 多试用调节植物神经、镇静、助消化、解痛等治疗, 疗效不够理想。行气整肠汤具有行气整肠, 疏通气机升降, 使壅滞胃肠之气得以下行而消胀止痛的作用, 实为临床行之有效的方药, 值得推广。

黑龙江省鸡西市中医院(黑龙江 158100)

(收稿: 1994—04—11)