

推按运经仪治疗胆绞痛 85 例

广西中医学院第二附属医院(南宁 530011)

李霞 彭绍杰 何辉

1989年5月~1992年10月我院应用HD-89-VA型推按运经仪治疗胆绞痛85例,取得了满意的效果。

临床资料 本组85例均根据病史、体征、B超和实验室检查等确诊的患者。其中男37例,女48例;年龄:18~78岁,平均49.2岁;病程1个月~35年;其中胆囊炎35例,胆囊结石32例,胆管结石12例,肝内胆管结石4例,胆道蛔虫2例。85例均用过中西药物治疗而反复发作的患者。每天发作1~5次者57例,6次以上者28例;阵发性绞痛向右肩胛区放射67例,持续胀痛4例,钻顶样绞痛2例,恶心、呕吐48例。

治疗方法 患者取左侧卧位或平卧位,根据临床辨证取穴。肝郁气滞型:取肩井—日月,阳陵泉—期门,胆俞—阿是穴;肝胆湿热型:取肝俞—期门,胆俞—日月,脾俞—章门,胆俞—阿是穴;脾虚寒阻型:取期门—梁门,章门—胆俞,足三里—阿是穴。采用北京市宏波自动化控制设备厂生产HD-89-VA型推按运经仪,先用手柄笔式电极点穴治疗5~15min后改用平板式电极程控调节治疗30min左右,输出频率选择II、III档频,刺激量从小逐渐增加,以患者能耐受为宜,点穴治疗一般调节在15%~30%左右,程控治疗调节在20%~70%左右。每天治疗1~2次,10天为1疗程。

结果 疗效标准:疼痛完全消失,1天内无复发为缓解;疼痛明显减轻,或有轻微隐痛为显效。疼痛无减轻,或稍有减轻但1天内反复疼痛为无效。

本组85例中,缓解83例,占97.65%,其中经治疗3~5min绞痛缓解者52例,6~15min绞痛缓解者22例,16~40min疼痛缓解者9例,无效2例。经随访观察0.5年,反复发作8例,占9.41%,继用本法治疗,同样获缓解。

体会 推按运经仪是根据中医理论中脏腑、经络、俞穴学说,运用中医独特的按摩手法,结合现代电子技术,将其产生的渗透力极强的脉冲信号刺激穴位。该仪器的脉冲信号能使俞穴电特性和人体生物电相耦合,发生“共振”来按摩组织器官,加速血液循环,促进组织器官的新陈代谢,调节神经功能,达到解除平滑肌、括约肌的痉挛,缓急止痛作用。另一方面,可能通过传感效应,致使大脑内5-羟色胺的代谢和γ-氨基丁酸的含量均发生明显改变,使痛阈增

高,而缓解疼痛。所以推按运经仪治疗胆绞痛是一种经济实惠,简便易行,无创伤痛苦,作用迅速,无毒副作用的新疗法,值得临床推广使用。

(收稿:1993-01-13 修回:1994-10-20)

清开灵注射液治疗小儿疱疹性咽峡炎 60 例

秦皇岛市耀华玻璃总厂医院(河北 066002)

杨丽萍

自1990年以来我院收治小儿疱疹性咽峡炎120例,其中采用清开灵注射液治疗60例,获得较好疗效。

临床资料 120例均符合《临床诊断和疗效标准》(南京:江苏科技出版社,1990:371)中的诊断标准,均系门诊患儿,且大多数在夏秋季发病。按随机抽签法分为治疗组和对照组,每组60例。治疗组中男36例,女24例,年龄6个月~8岁,平均4.3岁。体温:37.8~38.5℃48例,>38.5℃12例,咽痛拒食,流涎51例,咽部可见疱疹58例。对照组中男32例,女28例,年龄8个月~7岁,平均3.8岁,体温:37.5~38.5℃46例,>38.5℃14例,咽痛拒食,流涎54例,咽部可见疱疹56例。

治疗方法 治疗组单纯用清开灵注射液治疗,<1岁每次1ml,1~5岁每次2ml,5~8岁每次3~4ml,均为每日2次肌肉注射,3天为1疗程。对照组单纯用吗啉呱,每日15mg/kg,分3次口服,3天为1疗程。两组患儿体温>38.0℃者,用物理降温或西药退热剂对症治疗。

结果 疗效标准 临床治愈:疱疹3天内消失,发热者体温2天内恢复正常无反复。好转:疱疹4天内减少或消失,发热者体温3天内恢复正常或较前下降。无效:症状、体征无变化。

结果治疗组热退天数为1~3天,平均2天;疱疹消退时间为3~5天,平均4天。对照组热退天数3~5天,平均4天;疱疹消退时间4~8天,平均6天。治疗组和对照组的临床治愈分别为41例(68.3%)、9例(15%),好转为16例(26.7%)、25例(41.7%);无效为3例(5%)、26例(43.3%)。两组疗效比较,治疗组优于对照组($P<0.05$)。

体会 疱疹性咽峡炎属柯萨奇病毒感染,夏秋季发病率高,有流行趋势,儿童普遍易感,目前无特殊有效药物治疗,本病发热小儿易惊厥,咽痛显著影响小儿饮食。清开灵注射液治疗本病既可解表退热,防止惊厥,又有抗病毒的作用,且无副作用,可缩短病程,有一定的临床应用价值,值得推广。

(收稿:1992-03-02 修回:1994-11-20)