

- 的研究. 中国中西医结合大会论文集(北京). 1993: 5.
2. 崔玲, 陈楷. 清开灵注射液治疗脑血管痴呆的临床观察. 北京中医学院学报 1992; 15(3): 25.
 3. 张新农, 郭新华. “黄连解毒汤”治疗脑血管意外后遗症及多发性梗塞性痴呆 24 例. 实用中西医结合杂志 1992; 5: 146.
 4. 荒木五朗. 从临床角度看阿耳茨海默型老年痴呆. 国外医学·中医中药分册 1991; 13(4): 261.
 5. 王昌俊, 吕继瑞, 刘庆芬. 益智灵为主治疗老年痴呆 51 例. 中国医药学报 1993; 8(1): 33.
 6. 吴子明, 彭建龙. 益智灵冲剂对实验性老年痴呆病理模型的作用. 中国中西医结合杂志 1992; 12(10): 622.
 7. 吴金英, 王敏, 席时燕, 等. 益智灵对 D-半乳糖所致小鼠亚急性衰老模型的作用研究. 中药药理与临床 1992;

- 8(6): 18.
8. 高藤正巳, 苏国斌, 柳生隆视, 等. 老年痴呆の汉方治疗. 现代东洋医学 1993; 14: 518.
9. 张英鹤, 刘天培. 人参总皂甙对大鼠脑缺血再灌注损伤的保护作用. 中国药理学与毒理学杂志 1994; 8: 7.
10. 王红, 许哲, 刘干中. 党参对学习记忆的影响. 中药药理与临床 1993; 9(1): 34.
11. 常蜀英, 匡培根, 张均田, 等. 绞股蓝及单体 Rb₁ 对小鼠学习记忆的促进作用. 中国药理学通报 1988; 4: 358.
12. 张慈禄. 石杉碱甲治疗老年记忆功能减退. 新药与临床 1986; 5: 260.
13. 江黎明, 李志明, 韩宝铭. 神经生长因子活性中草药及其成分的筛选. 中草药 1994; 25: 79.

(收稿: 1994-04-27 修回: 1994-09-20)

自制玫瑰合剂治疗玫瑰糠疹 63 例

徐洪玉 陈洁 牛梅

自 1992 年 5 月起, 我们用中草药制成玫瑰合剂, 共治疗玫瑰糠疹 63 例, 并与用一般西药治疗的 32 例作对照观察疗效显著. 现报告如下.

临床资料 95 例患者均符合《临床皮肤病学》(第 2 版. 南京: 江苏科学技术出版社, 1990: 680) 诊断标准, 随机分为两组, 治疗组 63 例, 其中男 28 例, 女 35 例, 年龄 12~65 岁, 平均 32.6 岁, 病程 2~15 天, 平均 6.2 天. 皮疹为淡红色或玫瑰红色鳞屑性斑疹, 圆形或椭圆形, 其长轴与皮纹方向较一致, 分布以躯干为主, 波及颈部 16 例, 四肢 18 例, 同时波及颈部和四肢 12 例, 其他部位 17 例. 48 例患者有程度不同的痒感; 对照组 32 例, 男 15 例, 女 17 例, 年龄 13~68 岁, 平均 31.8 岁, 病程 2~14 天, 平均 6.1 天, 主要临床表现同治疗组, 波及颈部 10 例, 四肢 8 例, 同时波及颈部和四肢 5 例, 其他部位 9 例; 22 例患者有程度不同的痒感.

治疗方法 玫瑰合剂由荆芥 10g 防风 10g 赤芍 10g 生地 10g 白藓皮 10g 苦参 10g 金银花 12g 地肤子 12g 白蒺藜 12g 浮萍 6g 紫草 15g 板蓝根 20g 甘草 6g 组成, 将上述药物煎煮, 浓缩至每剂为 100 ml, 每毫升相当于原生药含量 1.43 g, 加入 30% 白糖矫味, 0.25% 苯甲酸钠防腐, 分装 200 ml 灭菌瓶中备用. 治疗组服玫瑰合剂每次 50 ml, 每日 2 次. 对照组服赛庚啶 2 mg, 每

日 3 次, 维生素 C 0.2 g, 每日 3 次. 两组瘙痒者均可适量外用皮质激素霜剂. 均治疗 2 周判断疗效.

结果 疗效标准: 皮疹全部消退为痊愈; 皮疹消退 > 80% 为显效; 皮疹消退 < 80% ~ > 50% 为有效; 皮疹消退不足 50% 为无效. 治疗组痊愈 62 例 (98.4%), 显效 1 例, 愈显率为 100%, 其中服药 3~5 剂痊愈 22 例, 6~8 剂痊愈 38 例, 12 剂痊愈 2 例. 平均治愈时间为 7.5 天, 治疗中未发现不良反应; 对照组痊愈 18 例 (56.2%), 显效 10 例, 有效 2 例, 无效 2 例, 愈显率为 87.5%, 平均治愈时间 12.4 天, 两组治愈率和治愈天数经统计学处理有显著差异 ($P < 0.01$). 对所有病例随访 2 周, 两组治愈病例均无复发.

体会 中医学认为本病系由血热内蕴、外受风邪所致腠理闭塞、郁久化热而生燥. 故选用清热凉血、疏风止痒的中草药制成玫瑰合剂, 方中荆芥、防风、浮萍、白蒺藜疏风止痒, 白藓皮清热解毒, 祛风止痒, 板蓝根、赤芍、紫草、生地凉血清热, 甘草调和诸药. 诸药合用, 共奏清热凉血、疏风止痒之功效, 较抗组织胺疗法有更加理想的效果. 制成合剂既避免了煎煮中药的麻烦, 又改善了中草药的口感, 便于服用, 值得推广应用.

(收稿: 1994-08-24 1994-11-15)