

可以阻止妊高征的病理过程的恶性循环。

从本组病例分析, 脉络宁治疗妊高征在消除水肿、缓解症状、改善血液流变性方面, 具有显著性意义, 降低平均动脉压作用优于硫酸镁, 但对血压明显增高者, 降压作用缓慢, 增加脉络宁用量后可取得满意效果。两组病例的分娩方式及对婴儿影响无明显差异, 提示脉络宁为治疗妊高征的良药。

参 考 文 献

1. 郑怀美, 苏应宽. 妇产科学. 第2版. 北京: 人民卫生出版社, 1984: 121.
2. 中国中西医结合妇产科专业委员会. 子宫内膜异位症、妊娠高血压综合征及女性不孕症的中西医结合诊疗标准. 中西医结合杂志 1991; 11(6): 376.
3. 徐云英, 胡大转. 建立病理生理基础上的妊娠中毒征的防治. 中华妇产科杂志 1981; 16: 3.
4. 顾亚夫, 赖尧基, 倪正, 等. 脉络宁治疗三种血栓病的疗效观察及其机理探讨. 中西医结合杂志 1987; 7(12): 718.

(收稿: 1994-01-17 修回: 1994-11-16)

生石灰酒精治疗带状疱疹 28 例观察

任 君 陈丽娟 王 杰 孙月英

我所近几年来对 28 例血液病化疗后发生的带状疱疹患者, 采用生石灰加酒精局部涂敷的方法治疗, 取得了良好的疗效。现将结果报告如下。

临床资料

我所自 1990 年 3 月~1993 年 9 月间收治的血液病患者中, 发生带状疱疹者 28 例, 其中急性白血病 24 例, 慢性白血病 2 例, 多发性骨髓瘤 1 例, 何杰金氏病 1 例。28 例中, 用环磷酰胺、长春新碱、氮甲喋呤、强的松(简称 COMP)化疗方案治疗 22 例, 其他化疗方案治疗 6 例。全部病例均在用化疗期间或停用化疗后 2~3 周之内出现局部皮肤灼热感或神经痛等前驱症状, 继而出现多数成群簇集的直径 1.2~5.0 mm 的丘疹和疱疹, 伴剧烈疼痛。疱疹主要分布在胸背部及腰腹部者 26 例, 右臂及右手指间者 1 例, 双下肢者 1 例。本组 28 例中, 男性 12 例, 女性 16 例, 年龄 18~63 岁。出疹病程为 2~7 天。

治疗方法

按照每 100 g 生石灰粉加 50%~70% 酒精 120 ml 比例, 先将生石灰粉装入烧杯中, 再倒入酒精搅拌均匀, 待气泡产生及消失后, 用无菌棉签涂抹在局部疱疹表面, 待干后再加涂一层, 反复多次, 直至形成较厚的保护膜。对于局部疱疹面积较大的患者, 可

配合转移因子肌肉注射; 如伴有发热症状, 可酌情选用抗生素。

结 果

治愈标准: 皮肤疱疹干燥结痂并脱落, 自觉症状消失。本组病例治疗后均获痊愈, 其中 27 例用药后 4~7 天结痂, 随后脱落, 1 例疱疹布及全躯干者 28 天治愈。本组病例无不良反应发生, 愈后皮肤触痛消失, 皮肤颜色均接近正常。

讨 论

生石灰具有燥湿、敛疮、止痛作用, 酒精具有挥发、活血、消炎作用, 将两者混合外涂, 旨在促进局部新陈代谢, 以达到减少渗出、缓解疼痛、加速结痂、缩短疗程、有效地防止痂下感染的目的。本组病例中, 27 例由于在病程早期应用了此方法, 有效地控制了病情的进展, 4~7 天内疱疹结痂、脱落而痊愈; 1 例因早期未能得到及时治疗, 病程长达 7 天, 疱疹布及全胸部和腰腹部, 并伴高热, 经用生石灰加酒精外涂, 配合转移因子、抗生素等药物治疗, 28 天后疱疹结痂、脱落, 皮肤触痛消失。实践证明: 生石灰酒精治疗带状疱疹, 具有缓解疼痛、减少渗出、促进结痂、缩短疗程、有效地防止痂下感染的优点, 值得推广。

(收稿: 1994-07-25 修回: 1994-12-06)