

3. 江伟世. 双黄连促 NK 细胞活性. 中国免疫学杂志 1992, 增刊: 107.
4. 王彩霞, 王井骏. 雾化吸入疗法的应用和进展. 河北医药 1988; 10(22): 34.
5. 张梓荆. 小儿病毒性呼吸道感染与病毒性肺炎. 北京: 中国医药出版社, 1990: 68.
6. Xu KJ, Su. KX, Lu YC. Human biavailability of the

- injection and the aerosol of Shuanghuanglian. CA 1993, 118(20): 417.
7. Xu. KJ, Zhang H, Wu LII. Stability of shuanghuanglian aerosol MK. 1993; 33(2): 2366.
 8. 张自良. 小儿反复呼吸道感染的免疫特点和防治. 河北医药 1988; 10(2): 31.

(收稿: 1993-04-10 修回: 1995-01-15)

自制复方皮炎净治疗神经性皮炎 40 例

石丽霞 王召华 范申云

我院自 1992 年 3 月~1993 年 11 月用自制复方皮炎净治疗神经性皮炎患者 40 例。并以醋酸氟轻松软膏和黑豆馏油软膏对比作观察, 获满意效果, 现介绍如下。

临床资料 将 80 例经确诊的门诊患者, 随机分成 3 组, 即复方皮炎净组(甲组)40 例, 男 22 例, 女 18 例; 年龄 20~40 岁, 平均 34.2 岁; 病程 6 个月~4 年, 平均 2.5 年。皮损范围 2~13 cm², 平均 8.2 cm², 病损部位面部 8 例, 颈部 16 例, 双肘 12 例, 骶部 4 例。醋酸氟轻松软膏组(乙组)20 例, 男 8 例, 女 12 例; 年龄 25~40 岁, 平均 35.5 岁; 病程 8 个月~3 年, 平均 2 年。皮损范围 1~11.5 cm², 平均 6.8 cm², 病损部位面部 4 例, 颈部 10 例, 双肘 4 例, 骶部 2 例。黑豆馏油软膏组(丙组)20 例, 男 6 例, 女 14 例; 年龄 23~38 岁, 平均 32.5 岁; 病程 6 个月~2.5 年, 平均 14 个月; 皮损范围 1.5~12 cm², 平均 7.6 cm²。病损部位面部 2 例, 颈部 10 例, 双肘 6 例, 骶部 2 例。

治疗方法 复方皮炎净组成: 苦参 150 g 蛇床子 150 g 黄柏 100 g 地肤子 100 g 白藓皮 100 g 防风 100 g 皂刺 100 g 樟脑 20 g 薄荷脑 10 g 苯酚 10 ml 乙醇 1000 ml 吐温 80 5 ml, 蒸馏水加至成 4000 ml。制备: 取苦参、蛇床子、黄柏、白藓皮、地肤子、防风、皂刺加水煎煮 3 次, 每次 1 h, 抽滤, 合并滤液, 放置 24 h, 倾取上清液备用; 另将樟脑、薄荷脑、苯酚置乳钵中, 研末加乙醇、吐温 80 摇匀, 静置取上清液分装于 100 ml 密闭塑料瓶内即得。用法: 甲组用复方皮炎净; 乙组用醋酸氟轻松软膏(沈阳市兴齐制药厂生产, 批号为 911101), 丙

组用黑豆馏油软膏(江苏南京六合县制药厂生产, 批号 820920)。3 组均外涂皮损处, 每日 2 次, 20 日为 1 个疗程。

结果 疗效标准 治愈: 20 日内皮疹全部消失, 自觉症状消失; 有效: 20 日内皮疹缩小 50% 以上, 自觉症状不明显; 无效: 20 日内皮疹缩小不足 50%, 自觉症状仍明显。结果甲、乙、丙 3 组治愈分别为 28 例(70%)、16 例(80%)、12 例(60%); 有效分别为 9 例(22.5%)、3 例(15%)、6 例(30%); 无效分别为 3 例(7.5%)、1 例(5%)、2 例(10%); 总有效率分别为 92.5%、95.0%、90.0%。三组比较, 无显著性差异($P > 0.05$)。

随访 1~2 年, 甲组 35 例, 其中治愈 27 例中只有 1 例皮疹处有瘙痒感。有效 8 例中, 4 例继续治疗皮疹已消失, 4 例间断性涂药, 皮疹消退不太显著, 但自觉症状消失; 乙组随访 18 例, 治愈 15 例, 有效 3 例均表现为停药 20 余日后, 皮疹复发并不同程度的加重; 丙组随访 17 例, 治愈的 11 例中有 2 例复发, 有效的 6 例中, 患者因不愿意接受继续治疗, 其中有 3 例皮疹明显瘙痒, 面积亦增大。

体会 中医认为本病为风热或血虚风燥所致, 且具有病程长、易复发的特点, 故我们选用具有散风清热止痒、养血祛风润燥作用的中药制成复方制剂, 不含激素, 涂后无明显刺激感和不良反应, 与醋酸氟轻松软膏和黑豆馏油软膏比较, 该药止痒效果好, 维持时间长, 复发率低; 但该药的需治愈时间和皮疹开始退缩时间较醋酸氟轻松治疗组为长, 与黑豆馏油软膏组相似($P > 0.05$), 这可能是由于两者均为中药制剂, 无激素, 作用特点慢等有关, 这将有待于更进一步的深入研究。

(收稿: 1994-02-10 修回: 1995-01-25)