

21. Jiang Yan, Zhong Guo-gan, Cheng Long, et al. Influences of ginsenosides Rb1, Rb2, and Rb3 on electric and contractile activities of normal and damaged cultured myocardiocytes. Acta Pharmacologica Sinica 1992; 13(5): 403.

22. 唐朝枢, 苏静怡. 山莨菪碱和异搏定对离体大鼠心脏“缺氧—复氧”损伤的防治作用比较. 中国病理生理杂志 1989; 5(5): 270.

23. 李杏, 陈俊秀, 孙家钧. 三七皂甙对大鼠实验性心肌缺血再灌注损伤的保护作用. 中国药理学报 1990; 11(1): 26.

24. 成建华, 钱家庆. 奎尼丁、蝙蝠葛碱、粉防己碱对大鼠复灌所致心律失常的影响. 中国药理学报 1989; 5(3): 151.

25. 胡国胜, 钱家庆, 程绍瑜, 等. 唐松草舒平定抗实验性心律失常作用. 中国药理学报 1990; 6(2): 109.

(收稿: 1993—05—17 修回: 1995—04—28)

## 对 120 例急性脑血管病患者的舌诊分析

李素华 童文丽

笔者在临床中发现, 出血性和缺血性脑血管病在发病初期舌象有显著不同, 现将资料完整的 120 例分析报告如下。

**临床资料** 120 例急性脑血管病患者, 发病时间 1~72 h, 均未经脱水治疗而入院。A 组 50 例为脑出血患者, 其中男性 35 例, 女性 15 例。年龄 41~76 岁, 平均 63.2±9.2 岁。B 组 70 例为脑血栓形成患者, 其中男性 51 例, 女性 19 例。年龄 40~85 岁, 平均 66.5±14.8 岁。诊断均符合 1986 年中华医学会第二次脑血管病学术会议第三次修订标准, 均经 CT 确诊。未合并糖尿病、肺心病、肿瘤及近期消化道出血。病灶大小按文献分类(中国急救医学 1991; 11(3): 31)。

**观察方法** 入院后由两人在自然光线下观察并记录舌体形态、色泽、运动; 舌苔性状、颜色和厚薄。舌象判定标准参考有关文献(吴翰香. 色脉舌诊. 上海: 上海科学技术出版社, 1987: 55—87)。

**结果** A 组、B 组 CT 检查的病灶大小与舌苔

性状 见表 1、2。两组舌诊对比, 见表 3。

表 1 A 组舌苔性状与 CT 检查 (例)

CT 病灶 (血肿容积 ml)	例数	白厚	白腻	薄黄	黄厚	黄黑
<21	24	1	3	18	2	0
21~50	17	1	0	8	7	1
>50	9	0	0	2	5	2
总计	50	2	3	28	14	3

表 2 B 组舌苔性状与 CT 检查 (例)

CT 病灶 (梗塞灶直径 cm)	例数	薄白	白厚	花剥	薄黄	黄厚
<1.6	31	29	2	0	0	0
1.6~3.0	19	8	7	2	2	0
>3.0	8	0	4	2	2	0
多发灶	12	8	2	1	1	0
总计	70	45	15	5	5	0

由表 1、2 可见, A 组 50 例中苔黄(包括薄黄、黄厚和黄黑)45 例, 苔白 5 例; B 组 70 例中苔白(包括薄白、白厚和花剥)65 例, 苔黄 5 例。

由表 3 可见, 舌体大小异常, B 组例数较多, 与

表 3 两组舌诊比较 (例)

组别 例数	舌体大小			舌尖位置		舌质颜色					舌苔性状						
	正常	瘦小	胖大	居中	偏斜	淡白	淡红	红	绛红	暗红	薄白	白厚	白腻	花剥	薄黄	黄厚	黄黑
A 50	44	0**	6**	5	45	0**	0	11**	26**	13*	0**	2	3	0	28**	14	3
B 70	28	11	31	6	64	52	14	0	0	4	45	15	0	5	5	0	0

注: 与 B 组比, \*P<0.05, \*\*P<0.01

A 组相比有显著性差异(P<0.01)。舌尖位置两组无显著差异。舌质颜色 A 组以红为主, B 组以淡白为主, 两组比较有显著性差异(P<0.01, P<0.05)。舌苔性状 A 组以黄苔为主, B 组以白苔为主, 两组比较有显著性差异(P<0.01)。

**讨论** 观察舌象变化, 知其病机转归。脑出血者, 出血量小, 舌体大小正常, 舌尖略偏斜, 舌质

红, 苔薄黄预后好。出血量大, 舌卷缩, 僵硬, 舌质暗红, 苔黄厚渐变黄黑结痂预后多差。脑血栓形成, 梗塞灶小, 舌质淡红, 苔薄白预后好。梗塞灶大或多发梗塞灶, 舌体瘦小或胖大, 舌卷缩、僵硬, 舌质淡白或暗红, 苔白厚或花剥, 舌面多津或流涎不止预后多不佳。脑出血舌质红, 舌苔黄, 示阴虚阳亢。脑血栓形成舌质淡白, 舌苔白厚, 示痰湿内盛, 气滞血瘀。

(收稿: 1993—09—19 修回: 1994—09—10)