

满意近期疗效。采用鸦胆子油乳剂腺体内直接注射可使癌硬结消失,腺体大小近正常,提示可使Ⅲ期以上癌转变至Ⅱ期以下之变化,为部分Ⅲ期以上患者创造了再行根治性前列腺切除术的机会。本组 10 例中有 3 例未行睾丸切除去势术,经用鸦胆子油乳剂腺体注射及静脉滴注治疗亦获 CR 疗效。提示对一些前列腺癌患者,鸦胆子油乳剂在无其他疗法配合下,亦能独立达到满意疗效。这对部分拒绝去势术患者更为适宜。我们曾用鸦胆子油乳剂对人前列腺癌细胞作体外影响实验观察到⁽⁴⁾:鸦胆子油乳剂微粒破坏细胞膜进入细胞浆,进而破坏线粒体、粗面内质网、核膜及染色质等细胞器。从而破坏癌细胞 DNA 合成。鸦胆子油乳剂对前列腺癌细胞有特殊亲合力,首先粘附癌细胞膜表面进而发挥作用。故静脉滴注此药后对转移灶亦有破坏作用。鸦胆子油乳剂对骨髓造血功能有促进

作用⁽⁵⁾,故此药无骨髓抑制、白细胞减少之毒副作用,值得临床试用。

参 考 文 献

1. 缪中良,章仁安. 泌尿外科诊断学. 上海: 翻译出版公司, 1989: 260—261.
2. 吴阶平. 泌尿外科学. 第 1 版. 济南: 山东科学技术出版社, 1993: 1077—1078.
3. 张炳兴,陈国雄,吴殿久. 前列腺癌的放射治疗. 中华放射学杂志 1991; 25(2): 102—103.
4. 贺大林,南勋义,刘文善. 10% 鸦胆子油静脉乳剂对前列腺癌细胞的影响. 临床泌尿外科杂志 1994; 9(增刊): 60—61.
5. 苏守元,刘景华,吴蕴炎,等. 10% 鸦胆子油静脉乳剂治疗肺癌转移 16 例临床疗效观察. 中西医结合杂志 1985; 5(2): 86—88.

(收稿: 1995—04—10 修回: 1995—10—09)

三金消石饮配合外治法治疗上尿路结石 78 例

黄俊山¹ 郭梅英²

1991~1994 年我们用三金消石饮配合外治法治疗上尿路结石 78 例,疗效满意。现报告如下。

临床资料 78 例中男 45 例,女 33 例;年龄 19~75 岁,平均 45.6 岁;病程 5 个月~35 年,平均 7.8 年;肾内结石 38 例,输尿管结石 40 例;伴肾盂积水 52 例、氮质血症 12 例、肾绞痛 53 例、血尿 67 例、感染 39 例,其中无症状者 5 例。结石大小直径为 0.3~1.2 cm,平均为 0.63 cm。均经腹部平片、B 超及静脉肾盂造影及同位素肾图等检查确诊为上尿路结石。

治疗方法 三金消石饮组成:鸡内金、海金砂、金钱草、路路通各 30 g,车前子(包)、王不留行、泽泻、扁蓄、杭芍各 15 g,猪苓、蒲黄、乌药、瞿麦各 10 g,木通 5 g。大便干加生大黄、滑石,湿热盛加苍术、黄柏,血尿明显加茜草根、地榆,肾绞痛加元胡、琥珀(冲)。每日 1 剂,水煎约 500 ml,顿服,并于服药后 1 h 以茺花 30 g 水煎浓缩后浸湿纱布,敷于结石侧肾区,进行离子导入(仪器为南京炮兵学院制 NPD-4B₂ 治疗仪),每日 1 次,每次 20 min。1 周为 1 个疗程,间隔 1 周后重复上述疗法,治疗时间 7 天~4 个月,平均 13.5 天。治疗期间每日过滤尿液,观察有无结石排出。2 个疗程后,复查腹部平片

或 B 超及尿常规。

结 果 疗效评定标准:治愈为临床症状(包括血尿、腰腹痛、尿路刺激征等)消失,腹部平片、B 超、静脉肾盂造影证实结石已完全排出,肾盂积水消退,尿常规检查连续 2 次以上正常。有效为临床症状改善,结石部分排出,肾盂积水减少,尿常规明显好转。无效为临床症状及上述检查无明显变化。结果:78 例中治愈 43 例,其中肾内结石 15 例,输尿管结石 28 例。有效 30 例,其中肾内结石 19 例,输尿管结石 11 例。无效 5 例,其中肾内结石 4 例,输尿管结石 1 例。

讨 论 尿路结石与梗阻、感染三者可互为因果,易形成恶性循环。尤其是出现肾绞痛、血尿、肾盂积水时,排石就成为治疗的重点。中医按石淋、血淋、腰痛等辨证。针对结石多为湿热蕴结,气化不利,水积凝结,结聚成石的病机特点,治以清利消通为主。以鸡内金、海金砂、金钱草“三金”通淋化坚消石;配合车前子、猪苓、木通、泽泻利水排石,并以王不留行、路路通化瘀通水;扁蓄、瞿麦利水通淋;乌药、杭芍调气和阴、蒲黄化瘀止血以为佐,配方合理,再加上茺花外治,增强逐水利尿之力,而无增加毒性之虑,内外合治排出结石,免除了体外震波及手术之苦,值得进一步研究改进。

(收稿: 1995—09—18 修回: 1996—01—06)

1. 福建医学院附属协和医院(福州 350001); 2. 福建省金鸡山工人温泉疗养院