

· 农村基层园地 ·

复方胃康灵治疗慢性胃炎

188 例疗效观察

成都市建设路 82 信箱医院(成都 610058) 吴琼英

成都太平寺 87433 部队

唐才东 廖秀全 黄正扬

成都空军后勤门诊部 刘仁清

成都市医药公司卫生科 刘劲松

1990 年 4 月~1994 年 4 月, 我们对 283 例慢性胃炎患者采用复方胃康灵治疗, 并用丽珠得乐作对照, 取得了满意疗效。现报告如下。

临床资料 本组患者均有不同程度的上腹部胀痛、打呃嗝气、泛酸, 经纤维胃镜和活检确诊为慢性胃炎。根据确诊顺序的先后将 283 例患者随机分为治疗组与对照组。治疗组 188 例, 其中男 128 例, 女 60 例; 年龄 18~68 岁, 平均 43.8 ± 15.4 岁; 病程 3 个月~27 年, 平均 14.0 ± 11.5 年; 其中慢性浅表性胃炎活动期 153 例, 胆汁返流性胃炎 28 例, 萎缩性胃炎 7 例。对照组 95 例, 其中男 57 例, 女 38 例, 年龄 15~70 岁, 平均 42.6 ± 14.9 岁; 病程 5 个月~25 年, 平均 13.0 ± 12.6 年; 其中慢性浅表性胃炎活动期 82 例, 胆汁返流性胃炎 9 例, 萎缩性胃炎 4 例。两组性别, 年龄, 病程均无显著性差异。

治疗方法 治疗组口服复方胃康灵(黄连 10 g 丹参 30 g 高良姜 15 g 川楝子 15 g 玄胡 30 g 郁金 15 g 海螵蛸 30 g 蒲公英 30 g 半枝莲 30 g 鸡血藤 30 g 酒大黄 2 g 代赭石 20 g 莱菔子 15 g 甘草 3 g 共研成粉压成片, 由空军成都医院制药厂生产, 每片含生药约 15 g), 每次 6 片, 每日 4 次, 饭前 1 h 和睡前各服 1 次。对照组口服丽珠得乐(珠海丽珠制药厂生产, 批号: 9006226), 每次 1 包, 每日 3 次, 于饭前 0.5 h 服。两组患者在治疗期间均停用其它任何药物, 疗程均为 4 周, 治疗前和治疗后 3 天内复查胃镜。在治疗期间, 两组患者均禁食辛辣食物、浓茶、烟酒等刺激性食物。

结 果

1 疗效判定标准 治愈: 临床症状消失, 食欲正常, 胃酸分泌正常, 胃镜及粘膜组织学改变基本恢复正常; 好转: 症状基本消失或上腹胀痛减轻, 胃酸分泌接近正常, 胃镜所见及粘膜组织改变减轻或病变范围缩小; 无效: 临床症状改善不明显, 胃镜检查炎症病变粘膜变化不大。

2 结果 治疗组治愈 124 例, 好转 51 例, 无效 13 例, 总有效率为 93.1%; 对照组治愈 46 例, 好转 33 例, 无效 16 例, 总有效率为 83.2%。治疗组与对照组总有效率比较, 经统计学处理 $P < 0.05$, 有显著性差异。

讨 论 慢性胃炎中医辨证以肝郁气滞, 中焦湿热, 气郁化火者居多。现代医学证实胃炎及消化性溃疡与幽门螺旋杆菌(HP)的感染密切相关。复方胃康灵重在清热疏肝解郁, 消炎杀菌, 行气化瘀止痛。玄胡、郁金能抑制胃液分泌, 同时可促进胆汁分泌和排泄, 保护胃粘膜, 防止胆汁返流; 大黄、黄连、高良姜、郁金、川楝子、蒲公英等药对 HP 有明显的抑菌作用, 故疗效明显高于对照组。该药药源丰富, 价格低廉, 服用方便, 值得基层医院广泛运用。

(收稿: 1995-06-30 修回: 1995-10-28)

保产无忧汤在促臀位自然回转中的应用

湖南郴州市立医院(湖南 423000) 周晓娟

湖南宜章麻田镇医院 谭克雄

自 1991 年 3 月~1994 年 8 月, 笔者分别采用膝胸卧式及艾灸至阴穴辅以保产无忧汤促臀位自然回转, 疗效较好, 现报告如下。

临床资料 将 30~36 孕周, 单胎、臀位、年龄 20~35 岁无禁忌症的孕妇共 100 例, 采用抽签法随机分为 A、B 两组。A 组 50 例, 年龄 20~33 岁, 平均 26.2 岁; 其中初孕妇 20 例, 经产妇 30 例; 30~32 孕周 12 例, 33~34 孕周 26 例, 35~36 孕周 12 例; 完全性臀位 20 例, 单臀 18 例, 不完全性臀位 12 例。B 组 50 例, 年龄 21~35 岁, 平均 27.3 岁; 其中初孕妇 20 例, 经产妇 30 例; 30~32 孕周 13 例, 33~34 孕周 25 例, 35~36 孕周 12 例; 完全性臀位 18 例, 单臀 22 例, 不完全性臀位 10 例。两组均以 B 超确诊并按照王淑贞分类标准(实用妇产科学, 北京: 人民卫生出版社, 1990: 413)进行分类。

治疗方法 A 组: 在促自然回转最佳期(单臀、不完全性臀位、羊水少、胎盘附着前壁的初孕妇为 30~32 孕周, 经产妇为 33~34 孕周; 完全性臀位的初孕妇为 33~34 孕周, 经产妇为 35~36 孕周)初始令其排空膀胱, 松解裤带, 行膝胸卧式, 15 min/次, 每天 2 次, 7 天为 1 个疗程。此法利用胎儿重心使胎臀退出骨盆促其回转(有心血管疾病者不宜使用此法)。在此期间同时服用保产无忧汤: 当归 4.5 g 川芎 4.5 g 菟丝子 3 g 川贝母 3 g 枳壳 1.8 g 白芍