

## · 农村基层园地 ·

### 银杏胶囊治疗 Binswanger

#### 氏病 18 例

山西省稷山县人民医院神经内科(山西 043200)

杨官成

Binswanger 氏病是一种慢性进行性脑病, 目前尚无特效治疗方法。自 1993 年 2 月~1995 年 3 月, 笔者应用银杏胶囊口服治疗本病 18 例, 疗效满意, 现报道如下。

**临床资料** 诊断标准依据文献[实用内科杂志 1989; 9(11): 545], 并均经头颅 CT 检查证实。32 例随机分为两组, 对照组 14 例(门诊 4 例, 住院 10 例), 男 13 例, 女 1 例, 年龄 50~60 岁 6 例, 60 岁以上 8 例; 病程 6 个月~3 年, 平均 17 个月; 有高血压病史者 9 例, 有糖尿病史者 2 例, 有冠心病史者 3 例; 主要临床特点: 记忆力减退及智能衰退 9 例, 轻度偏瘫伴锥体束征阳性 2 例, 情感性格改变 3 例; 根据长谷川氏简易智能测验记分: 29.5~20 分者 5 例, 19.5~10 分者 9 例; 头颅 CT 示 14 例均表现双侧脑室周围及半卵圆中心白质低密度, 伴基底节区腔隙性梗塞 11 例, 伴不同程度脑室扩大、脑萎缩者 3 例。观察组 18 例(门诊 7 例, 住院 11 例), 男 14 例, 女 4 例; 年龄 50~60 岁 8 例, 60 岁以上 10 例; 病程 6 个月~3.5 年, 平均 17.5 个月; 有高血压病史者 11 例, 有糖尿病史者 4 例, 冠心病史者 5 例; 主要临床特点: 记忆力减退及智能衰退 12 例, 轻度偏瘫伴锥体束征阳性 3 例, 情感及性格改变者 3 例; 长谷川氏简易智能测验记分: 29.5~20 分者 6 例, 19.5~10 分者 12 例; 头颅 CT 示 18 例均表现双侧脑室周围及半卵圆中心白质低密度, 伴基底节区腔隙性梗塞 10 例, 伴不同程度脑室扩大、脑萎缩者 3 例, 同时伴基底节区腔隙性脑梗塞及脑室扩大、脑萎缩者 5 例。两组资料具有可比性。

#### 治疗方法

1 对照组全部服用脑复康(合肥利民制药厂生产), 每次 0.8 g, 每日 3 次口服, 维脑路通(河南焦作第一制药厂), 每次 0.2 g, 每日 3 次口服, 维生素 E 胶丸(安徽合肥第二制药厂生产), 每次 0.1 g, 每日 3 次口服。3 个月为 1 疗程。

2 观察组用银杏胶囊(山西医学院制药厂生产, 每丸含生药 30 mg), 每次 90 mg, 每日 2 次口服, 3 个月为 1 疗程, 脑复康、维脑路通、维生素 E 剂量同

对照组。两组均用药 1 个疗程评定疗效。

#### 结果

1 疗效判定标准 根据长谷川氏简易智能测验表[临床荟萃 1989; 4(3): 126], 显效: 积分较原基础增加 10 分; 有效: 积分较原基础增加 5 分; 无效: 治疗前后无变化。头颅 CT 复查, 测量 CT 值密度, 灰白质密度差值较前进步  $\geq 2$  Hu 为有效(正常相差  $(5\sim7)\pm 1.3$  Hu, 而 Binswanger 氏病可达  $(11\sim15)\pm 2.1$  Hu), 前后无变化者为无效。

2 结果 对照组 14 例, 智能测验结果, 显效 2 例, 有效 3 例, 无效 9 例, 总有效率 35.7%; 头颅 CT 复查 8 例, 有效 2 例占 25.0%, 无效 6 例。观察组 18 例, 智能测验结果, 显效 5 例, 有效 11 例, 无效 2 例, 总有效率 88.9%; 头颅 CT 复查 12 例, 有效 8 例占 66.7%, 无效 4 例。观察组疗效优于对照组(经  $\chi^2$  检验,  $P < 0.05$ )。随访结果: 对照组 5 例, 其中显效 2 例, 有效 3 例, 0.5 年后症状有反复 2 例, 3 例无变化。观察组 16 例, 其中显效 5 例, 有效 11 例, 0.5 年后症状有反复 2 例, 余 14 例无变化。

**体会** Binswanger 氏病又称慢性进行性皮质下脑病, 是大脑皮质下广泛缺血性脱髓鞘病变。最早于 1894 年由 Binswanger 首次报道。本病多在 50 岁以后发病。目前本病无特效治疗办法。本组病例采用银杏胶囊口服, 疗效较好。银杏胶囊是银杏叶提取物制备而成, 其有效成分为槲皮素、山萘酚、木犀草素等黄酮醇及甙类。有报道其具有选择性显著扩张脑血管, 增加脑血流量, 降低脑血管阻力, 抑制血小板聚集和抗纤溶活性功能, 同时还具有扩张冠脉和增加冠脉血流量作用; 并有抗血栓、抗凝血作用, 同时有中和内毒素, 而纠正微循环障碍作用, 对 Binswanger 氏病理过程起到一定的干预及逆转作用。

(收稿: 1995-10-04 修回: 1996-02-10)

### 丹参、黄芪加黄体酮治疗

#### 肝硬化腹水 31 例

四川省绵阳市中医院内科(四川 621000) 胡宗洋

自 1991 年 1 月~1994 年 6 月, 笔者应用中药丹参、黄芪加黄体酮治疗肝硬化腹水 31 例, 效果满意。现报告如下。

**临床资料** 本组 31 例(住院 16 例, 门诊 9 例, 家庭治疗 6 例); 男 21 例, 女 10 例; 年龄 23~76 岁, 平均 49.5 岁; 第 1 次出现腹水 8 例, 第 2 次出现腹水 14 例, 反复出现腹水 9 例; 肝炎后肝硬化 19