

参 考 文 献

1. 李鸣真, 叶望云, 林菊云, 等. “热毒清”抗内毒素的实验研究. 同济医科大学学报 1989; 18(2): 87—90.
2. 陶义训, 章谷生, 孙 荫. 临床免疫学检验(上册). 第 1 版. 上海: 科学技术出版社, 1983: 18.
3. 张克坚. 琼脂糖法白细胞趋化实验. 中国医科大学学报 1984; 13(4): 70—72.
4. Hegesh E, Shiloah J. Blood nitrates and infantile methemoglobinemia. Clin Chim Acta 1982; 125(2): 107—115.
5. 王士雯, 范 利, 贾万钧, 等. 过敏毒素 C_{5a}与老年多器官衰竭(MOF). 免疫学杂志 1989; 5(3): 209.
6. Hack CE, Hart M, Van schijndel RJMS, et al. Interleukin-8 in Sepsis: relation shock and inflatory mediators. Infection Immunity 1992; 60(7): 2835—2842.

7. Deitch EA. Multiple organ failure. Pathophysiology and potential future therapy. Am surg 1992; 216(2): 117—134.
8. Moncada S, Palmer RMJ, Higgs EA. Nitric oxide: physiology, pathophysiology, and pharmacology. Pharmacol Rev 1991; 43(2): 109—142.
9. 李鸣真, 叶望云, 涂胜豪, 等. 热毒清防治内毒素性 DIC (续)——保护肝微粒体、钙稳态和抗自由基的实验研究. 危重病急救医学 1993; 5(5): 262—265.
10. 吴朝栋, 李鸣真, 张艳萍, 等. 中药热毒清对内毒素 DIC 家兔血浆肿瘤坏死因子- α 、白细胞介素-6 水平影响的研究. 中国中西医结合杂志 1995; 15(6): 356—358.
11. Mukaida N, Gussella GL, Kasahara T, et al. Molecular analysis of the inhibition of interleukin-8 production by dexamethasone in a human cell line. Immunology 1992; 75: 674—679.

(收稿: 1995—11—27 修回: 1996—03—15)

中西医结合无痛一次性根治尖锐湿疣 37 例

孟战战 邹永清

我们从 1993 年 12 月~1995 年 11 月用中西医结合方法治疗尖锐湿疣 37 例, 疗效较好, 现报告如下。

临床资料 本组 37 例均经病理诊断证实为尖锐湿疣, 为本院男性专科门诊患者, 年龄 18~47 岁, 平均 31 岁。病程 2 个月~4 年, 平均 4 个月。已婚者占 73%。外地流动人员占 27%, 司机及个体经营者占 19%, 餐馆员工占 8%, 军人及干部各 1 例。37 例中否认性接触史者 7 例。病理分布特点: 37 例的疣体均主要生长于龟头, 其中 34 例的疣体同时浸及冠状沟及包皮系带, 34 例中又有 5 例还同时浸及包皮的皮肤; 37 例中另 3 例除浸及龟头外, 还同时浸及尿道外口。

治疗方法 外敷麻药散的制备和使用: 先将中药草拔 4g 乳香 6g 没药 6g 生南星 10g 川乌 10g 草乌 10g 肉桂 12g 半夏 10g 胡椒 6g 风茄果 15g 白丁香 6g 蟾酥 5g 共研细粉, 以 75% 酒精 70 ml 调成糊状即成外敷麻药散, 盛入研口瓶备用。每例患者取外敷麻药散 20 g 敷于患处及四周, 不必包裹, 待 20 min 后, 取掉外敷麻药散, 即可达到完全无痛。然后用上海产一次性皮试注射器向湿疣基底注射 5-氟脲嘧啶针剂 0.01~0.02 ml

(0.25~0.5 mg), 使之成为一个皮丘, 皮丘以稍超出疣基底 2 mm 范围为度。每个疣体基底各注射一个相同的皮丘, 立即剪掉疣体送病理检查。最后撒上一层自配的甘石丹粉约 2 g, 甘石丹粉由东丹 10 g 炉甘石 15 g 石膏 12 g 乌贼骨 15 g 冰片 5 g 共研细粉而成。撒药粉后以无菌纱布包裹 24 h。

结 果 37 例麻药过后均无疼痛, 37 例中有 31 例于治疗后 24~72 h 内疣体从基底干痂脱落, 6 例于治疗后 72 h 后干痂脱落。干痂脱落后不留疤痕, 亦无色素沉着, 治愈率 100%。37 例中有 29 例随访 0.5 年以上, 8 例随访 1 年以上, 均无复发迹象。

体 会 人类乳头瘤有 50 多种类型, 导致尖锐湿疣的是 6、11、18 型, 5-氟脲嘧啶是嘧啶类氟化物, 治疗尖锐湿疣的机理在于阻断了尖锐湿疣病毒的核苷酸合成酶, 从而阻断病毒 DNA 和 RNA 的合成而消灭病毒, 使之根治成为可能。外敷麻药散中风茄果、蟾酥、川乌、草乌、生南星外用均可麻醉末梢神经, 配以乳香、没药活血止痛, 肉桂、草拔温通血脉并加强麻醉效果, 便于在无痛下穿刺注药和剪切标本送检。甘石丹粉中的石膏、东丹消炎防腐, 冰片引诸药渗透并起收敛作用, 全方共奏生新促愈作用, 使创面速愈。

第四军医大学唐都医院泌尿外科男性专科(西安 710038)

(收稿: 1995—12—25 修回: 1996—03—06)