

2. 吴望一. 形成人下血栓的 Chandler 圆环内的流动分析. 中国科学 1981; (2): 1453.
3. 中国中西医结合学会周围血管疾病专业委员会. 周围血管疾病诊断及疗效标准. 临床荟萃 1990; (增刊): 29—30.
4. 尚德俊, 秦红松. 中西医结合治疗周围血管疾病. 北京: 人民卫生出版社, 1989: 156.
5. 翁维良, 廖福龙, 吴云鹏, 等. 血液流变学理论及其应用. 北京: 人民卫生出版社, 1989: 156.
6. Levy PJ, Gonzalez FM, Rush DS, et al. Hypercoagulable states as an evolving risk for spontaneous venous and arterial thrombosis. J Am Coll Surg 1994; 178: 266.
7. 刘培生, 简莉莉, 马陈锐. 腹部手术前后血液流变学变化初探. 中华实验外科杂志 1992; 9: 封三.
8. 陆立, 刘永成, 李继先, 等. 盆腔术后下肢深静脉血栓形成原因的探讨. 中华外科杂志 1996; 7: 398.
9. Coon WW. Venous thromboembolism prevalence, risk factors, and precaution symposium on pulmonary embolism and hypertension. Clinics in Chest Medicine 1984; 5 (3): 391—393.
10. Gorn, JM. Occult cancer in patients with acute pulmonary embolism. Ann. Zn then Med 1982; 96: 556—558.
11. 冯友贤, 孙建民. 血管外科学. 第二版. 上海: 上海科学技术出版社, 1992: 531—535.
12. 李国贤. 从体外血栓形成和血小板粘附探讨血栓与癌. 中西医结合杂志 1987; 7(12): 762—763.
13. 夏阳, 戚其学, 单吉贤, 等. 胃癌浸润转移过程中血液流变学研究. 中华实验外科杂志 1994; 11: 15.
14. Flane C, Spencer F. Postoperative deep vein thrombosis. Effect of intensive prophylaxis. Lancet 1969; 1: 447.
15. Tsapogas MJ. Postoperative venous thrombosis and effectiveness of prophylactic measures. Arch Surg 1971; 148: 561—562.
16. 松川保. 老人ホーム在住者の凝固纤溶能の経年変化. 血液と脉管 1984; 15: 207—208.
17. Withelmsen L, Keeling FP. Fibrinogen as a risk factor for stroke and myocardial infarction. N Engl J Med 1984; 311: 501.
18. 前川正. 老年者と临床検査成績の評価. 血液凝能、纤溶能. 治疗 1976; 58: 353—354.
19. 胡慧明. 通脉散治疗血栓性静脉炎的血液流变学观察及疗效分析. 天津中医 1987; (5): 26—27.

(收稿: 1996—03—24 修回: 1996—09—19)

中西医结合治疗急性根尖周围炎 67 例临床观察

尤澍恩

牙齿根尖周围炎, 简称根尖炎. 按病程发展可分为急性和慢性两类型. 急性又可分为急性浆液性根尖炎和急性化脓性根尖炎. 1990 年 3 月~1995 年 3 月, 我们对 67 例急性根尖周围炎患者采用中西医结合治疗取得满意疗效, 现总结如下.

临床资料 67 例患者均来自本院或外院门诊. 男 46 例, 女 21 例; 年龄 18~61 岁, 平均 29 岁. 20~40 岁者占 75%. 其中急性浆液性根尖炎 52 例, 急性化脓性根尖炎 15 例. 均符合《口腔病防治学》(北京医学院口腔医学系编) 的诊断标准. 急性浆液性根尖炎: 疼痛呈自发性、持续性、局限性, 患牙有明显浮出和伸长感, 叩诊时剧痛. 急性化脓性根尖炎: 疼痛呈自发持续性跳痛, 较剧烈, 患牙有明显肿胀和松动感. 按中医辨证分型属胃热实火型: 胃腑蕴热, 循经上蒸于牙龈, 故牙龈红肿疼痛, 口渴而有臭气; 上下牙痛, 牵引头脑, 满面发热, 其牙喜寒恶热; 阳明燥结, 故大便秘; 舌苔干黄, 脉象洪数.

治疗方法 以中西医结合治疗. 西药常规口服红霉素 0.25mg、鲁米那 30mg、谷维素 30mg、维生素 B₁ 20mg, 每日 3 次, 连服 3 天. 根据中医辨证分型用药. 方剂主要以清阳明经热, 佐以凉血养血, 方用清

胃散加减: 当归 9g 黄连 9g 牡丹皮 9g 生地 15g 生石膏 30g 栀子 30g 升麻 3g. 每天 1 剂水煎服, 3 天为 1 个疗程, 一般 1 个疗程评定疗效.

结果 疗效标准: (1) 缓解: 1 个疗程后, 疼痛完全消失, 无叩痛. (2) 好转: 1 个疗程后疼痛消失, 而有轻微叩痛. (3) 无效: 1 个疗程后疼痛无明显减轻, 叩痛存在. 结果: 缓解 47 例, 好转 13 例, 无效 7 例 (7 例患者均因发病时间长而转为慢性根尖炎). 缓解者最短复发时间为 5 个月 11 例, 最长已达 2 年未见复发 18 例, 一般均维持 1 年左右.

讨论 治疗胃热实火证的急性根尖周围炎用方除清阳明经热以外, 更佐以凉血养血之品. 方用黄连、栀子苦寒泻火, 生地、丹皮凉血清热, 当归养血和血, 升麻为阳明引经药, 又具清热解毒之功, 从而达清胃火凉血热之效, 加石膏则清胃之功更加显著. 如大便秘结者, 可酌加大黄以导热下行, 则取效更捷. 加用红霉素消炎, 鲁米那镇静, 维生素 B₁、谷维素是维持中枢神经和周围神经及植物神经代谢平衡的辅助药物, 配合使用故疗效较好. 本病疗效与病程有关, 病程愈短则疗效愈佳, 反之则较差, 对转为慢性根尖炎者效果更差.

(收稿: 1996—04—22 修回: 1997—01—17)