

• 基层园地 •

复方蛇床子贴膏治疗神经性皮炎 60 例

河北医科大学第二医院 (石家庄 050000)

王刚生 四荣联 王凤琴 姚春华

南国荣 郭文友 邓洁华

1995 年 2 月~1996 年 6 月,我们以复方蛇床子贴膏治疗神经性皮炎 60 例,取得满意疗效,并与肤疾宁贴膏对照,现报告如下。

临床资料 从我科门诊选择 90 例局限性神经性皮炎患者,均符合《皮肤病学》(杨国亮主编,第 1 版,上海:上海医科大学出版社,1992:469)诊断标准。分为 2 组,治疗组 60 例,男 37 例,女 23 例;年龄 24~45 岁,平均 33 岁;病程 1 个月~5 年,平均 1.6 年;发病部位:颈部 22 例,肘窝 17 例,腘窝 6 例,踝部 3 例,颈部及肘窝同时发病 12 例。对照组 30 例,男 22 例,女 8 例;年龄 18~37 岁,平均 29 岁;病程 20 天~3 年,平均 9 个月;发病部位:颈部 10 例,肘窝 14 例,颈部及肘窝同时发病 6 例。近 2 周内未接受过任何治疗。

治疗方法 药物组成:蛇床子 15g 白鲜皮 12g 当归 10g 丹参 10g 薄荷 1g 达克罗宁 1g 苯海拉明 0.5g 基质(以橡胶为主)50g。制成贴膏(由石家庄新华制药厂配制),用上海卫生材料厂生产的肤疾宁贴膏做对照治疗。方法:取与皮损面积大小相同的贴膏,贴于患处,48h 更换 1 次,用药 6 天停药 1 天,14 天为 1 个疗程,观察 2 个疗程。对治愈的患者随访 3 个月,观察复发情况。

结果 (1)疗效标准:皮疹全部消退,无新皮疹,自觉症状消失为痊愈;皮疹消退 70% 以上,未有新皮疹,自觉症状基本消失为显效;皮疹消退 50% 以上,偶有新皮疹,自觉症状减轻为有效;皮疹消退不足 50%,有新皮疹,仍有自觉症状,或用药后无明显改变者为无效。(2)结果:治疗组 60 例中痊愈 34 例(56.67%),显效 15 例(25.00%),有效 9 例(15.00%),无效 2 例(3.33%),总有效率 96.67%。对照组 30 例中痊愈 19 例(63.33%),显效 6 例(20.00%),有效 3 例(10.00%),无效 2 例(6.67%),总有效率 93.33%,经统计学处理, $\chi^2=0.52, P>0.05$,说明治疗组与对照组的疗效基本相同。对两组治愈的神经性皮炎进行了 3 个月的复发情况观察,结果治疗组 34 例中有 4 例复发,复发率为 11.76%,对照组 19 例中有 9 例复发,复发率为 47.37%,两组有显著性差

异($\chi^2=8.35, P<0.005$),治疗组优于对照组。(3)副作用:治疗组 2 例治疗无效的患者,1 例未坚持治疗,1 例用药后第 6 天皮肤轻度红斑、发痒,改用其他药物治疗。对照组 2 例无效的患者,分别在第 3 天、5 天出现不同程度的红斑发痒,而停止治疗。

讨论 中医认为神经性皮炎属血虚风燥,配方中当归养血润燥,丹参活血化瘀,养血安神,白鲜皮、薄荷、蛇床子可消风、祛湿、润肤、止痒。达克罗宁可调节皮肤感觉神经冲动传导,有止痒、止痛和抗感染作用,苯海拉明既可止痒又可预防胶膏反应。配制成中西医结合的贴膏治疗神经性皮炎,疗效高,治愈后不易复发,优于含有激素的肤疾宁贴膏,弥补了激素类外用药物治疗后很快复发的不足,是治疗神经性皮炎的有效方法。

(收稿:1996-11-11 修回:1997-02-23)

中西医结合治疗痈与头疽

江西省余干县人民医院 (江西 335100)

张建民 张小荣

笔者 1984 年 6 月~1995 年 7 月采用中西医结合治疗痈与头疽 68 例,取得满意效果,现报告如下。

临床资料 68 例均为门诊患者,参照有关标准(顾伯康,中医外科学,第 1 版,上海:上海科学技术出版社,1986:62—65,71—72)确诊。其中男 40 例,女 28 例,年龄 8~64 岁,平均 32 岁,病程 3~14 天,平均 7 天。68 例患者中痈 22 例,头疽 46 例,均有不同程度的畏寒发热、头痛、口渴、便干、尿黄、舌质红、苔黄燥、脉滑数,证属毒热炽盛、壅阻经络型。

治疗方法 取露蜂房数只,刷尽泥灰,除尽杂质,置于耐火容器内,加盖,缝口用盐泥封固,用中火煨烧至透后,停火冷却后呈黑褐色块状,取出研细加以麻油调成糊状,消毒后瓶装备用。局部以生理盐水冲洗,化脓者使用 12 号消毒针头抽尽脓液挑尽脓栓后冲洗干净,加以 3% 双氧水清洗、擦干,以毛笔蘸取露蜂房油液适量涂布,每天 1~2 次,待脓净、肿消、痛止可停。另于病程初起选用黄连解毒汤:黄连 9g 黄芩 9g 黄柏 9g 栀子 9g 煎服,每天 1 剂,共服 5 剂。若热甚而津液已伤,舌质光绛者可加用麦门冬 12g,沙参 12g,生地 9g。局部已化脓者,方用透脓散加减:金银花 40g 连翘 15g 黄连 5g 赤芍 15g 蒲公英 30g 炒山甲 20g 炒皂刺 20g 生黄芪 50g 白芷 20g,每天 1 剂,分 2 次服。治疗 5 天为 1 个疗程,必要时服 2 个疗程。4 例畏寒高热严重,有败血症征象,成人加用利福平