

临床症状,改善日常生活能力和神经缺损,它对 VaD 的总有效率达 53.12%,显著地优于经典益智药物喜得镇的疗效。

益智胶囊治疗 VaD 的机制可能是多方面的。导致 VaD 发病的主要原因是由于脑动脉硬化而引起脑血流下降。造成脑血流下降至少有两种原因,一是由于脑动脉狭窄或闭塞导致脑组织灌流量的降低;二是由于脑组织功能的兴奋性降低,导致脑代谢率的降低和脑血流量降低。本药可以明显改善一些降低的脑动脉血流速度,明显降低全血粘度,对红细胞聚集和变形能力异常者有明显的改善作用,提示本药对可能具有改善脑血流的作用;同时本药可以显著改善部分患者脑电地形图的慢波化进程,其中有 2 例转为正常,本药还可以改善老年人的平衡能力,提示本药中枢神经细

胞的功能状态有明显的改善作用。

参 考 文 献

1. 中华人民共和国卫生部.中药新药治疗痴呆病的临床研究指导原则.中药新药临床研究指导原则.下集.1995:206—209.
2. 中华人民共和国卫生部.中药新药治疗中风病的临床研究指导原则.中药新药临床研究指导原则.上集.1995:32—40.
3. 中华人民共和国卫生部.中药新药治疗老年病的临床研究指导原则.中药新药临床研究指导原则.见:北京市卫生局编.新药审批规定汇编.1988:347—352.
4. 田金洲主编.中医老年病学.第 1 版.天津:天津科学技术出版社,1994:55—66.
5. 傅仁杰执笔.老年痴呆病的诊断、辨证分型及疗效评定标准(讨论稿).中医杂志 1991;32(2):56—58.

(收稿:1997—01—22 修回:1997—03—15)

中药治疗尖锐湿疣 10 例

钱黎华 王侠生 杨蜀媚

尖锐湿疣是一种由人类乳头瘤病毒(HPV)感染而引起的性传播疾病,现收集 10 例单独用中药治疗的患者,并报告如下。

临床资料 (1)诊断标准:病史:患者有婚外性交史,或嫖娼史,或配偶感染史;体征:生殖器或肛门部位出现单个或多个丘疹状、乳头状、菜花状或鸡冠状潮润肉质赘生物,表面粗糙角化,即可临床确诊。临床检查:皮损 5% 醋酸白试验阳性(参考中华人民卫生部防疫司编.性病防治手册)。(2)自拟疣体复发性诊断标准:指 1 个月内行 2 次以上激光或高频电刀手术,术后 1 周内疣体数目反而增多,基底面反而扩大。(3)临床资料:10 例患者均来自性病门诊,男 4 例,女 6 例;年龄 28~35 岁,平均 31 岁;病程 12~74 天,平均 43 天;其中疣体初发的仅 1 例(位于左腹股沟,并伴有疤痕体质);疣体呈复发性的有 9 例,其中 1 例位于尿道内,用“疣敌”后退而复发;1 例位于肛乳头,疣体数目多且暴露不佳;2 例位于包皮及龟头,伴包皮过长;3 例位于阴道口 6 点钟处,伴白带过多;2 例位于阴道内,经激光治疗后疣体复发,表面有脓液伴白带恶臭。上述疣体呈粟米状、乳头状、鸡冠状或菜花状;绿豆至胡桃大;多数为簇集分布,部分为散在分布,也有单个存在;颜色为淡红或肉色;局部瘙痒不等。这些患者血清中抗 HIV 抗体初筛试验均阴性,生殖道中的衣原体、支原体、淋球菌检查均阴性。

治疗方法 内服中药,组成:虎杖 30g 山慈姑 15g 山豆根 12g 板蓝根 30g 土茯苓 30g 黄柏 12g 山梔 12g 苦参 15g 蕺苡仁 30g 蒿术 12g 郁金 12g 碧玉散 9g,每日 1 剂,水煎分两次早晚空腹服。外洗:上方药渣煎汤 500ml,外洗患部或冲洗阴道,每日 1 次,每次 15min;若痒甚,则可另加地肤子 12g,川椒 9g。2 周为 1 个疗程,治疗 4 个疗程判定疗效。治疗期间嘱禁止房事,戒烟酒。

结 果 (1)疗效标准:治愈:经 4 个疗程治疗后疣体全部消除,随访 2 个月无复发者;好转:经 4 个疗程治疗疣体明显缩小;无效:经 4 个疗程治疗疣体无明显变化或反而增大。(2)结果:本组 10 例治愈 9 例(其中 2 例尖锐湿疣患者疣体消失后行包皮环切术);好转 1 例(为尿道内尖锐湿疣),但停止治疗后又复发。不良反应:治疗期间有 2 例患者诉服中药后胃部不适,加用白术 9g 后症状缓解;外洗中药后无接触性皮炎等不良反应。

讨 论 该病治疗主要采用清热解毒中药。但这些药物起效较慢,2~3 周内不要轻易放弃治疗。其次要辅以清利下焦湿热的药物,因患者包皮过长、白带多而臭所造就的温暖潮湿环境是符合下焦湿热的征象的。临幊上也证实了在这种环境下 HPV 病毒最易繁殖。治疗后疣体首先缩小,变平坦,以后逐渐消失,最终皮肤粘膜变得光滑如初。故此种方法避免了因物理治疗所造成的创面大、易感染而不易愈合的缺点。

(收稿:1996—12—20 修回:1997—04—02)