

与促进心脏侧支循环、改善微循环障碍,增加缺血区供血及提高心肌耐缺氧能力有关。

冠状动脉痉挛是心绞痛重要的发病因素,实验观察到通心络胶囊由垂体后叶素诱发大鼠心电图缺血性改变有明显的改善作用,证实通心络胶囊能够保护大鼠垂体后叶素所致心肌缺血,与犬抗心肌缺血实验研究结果是一致的。心律失常可由心肌缺血所致心肌损伤引起,一定剂量的氯仿可提高心肌的自律性导致室性早搏、室性心动过速,甚至室性颤动。本实验采用氯仿所致小鼠室性纤颤动物模型,以利多卡因作为阳性对照药观察了通心络胶囊对小鼠室性纤颤的影响,结果显示有明显抑制氯仿引起的小鼠室性心律失常。

近年的临床与实验研究证实 LDL 的浓度与冠心病的形成有着密切的联系,降低血清中高胆固醇水平,可以

延缓动脉粥样硬化的发展^[4]。实验采用琼脂糖凝胶电泳法测定了高脂大鼠血清 TC 及 LDL,结果表明,通心络胶囊可明显降低食饵性高脂血症大鼠的血脂水平。

参 考 文 献

1. 中医研究院西苑医院基础室药理组. 心外膜心电图方法的改进. 新医药学杂志 1978;(11):52—53.
2. 刘建勋, 尚晓泓. 生脉注射液对犬急性实验性心肌缺血的影响. 中西医结合杂志 1990;10(基础理论研究特集):30—31.
3. 徐叔云, 卞如濂, 陈 修主编. 药理实验方法学, 第 1 版. 北京: 人民卫生出版社, 1982:754—755.
4. 欧 明主编. 冠心病证治与现代研究. 青岛: 青岛出版社, 1994:45—47.

(收稿:1997—01—10 修回:1997—04—01)

中西医结合治疗寻常性痤疮 60 例

张 芃

近年来采用中西医结合方法治疗寻常性痤疮 60 例,并与口服西药及外洗的对照组 30 例比较,现将结果报告于下。

临床资料 本组病例均来自门诊,根据就诊时间,单号为治疗组,双号为对照组。治疗组 60 例,男 24 例,女 36 例;年龄 13~43 岁,平均 23.5 岁;病程 1 个月~20 年,平均 3.5 年。对照组 30 例,男 14 例,女 16 例;年龄 18~34 岁,平均 25 岁;病程 1~20 年,平均 2.3 年。

90 例中全部属于寻常性痤疮,皮疹表现主要是炎性丘疹、脓疱、黑头粉刺,绝大部分发生于面颊部,只有 7 例同时胸背有发疹。53 例有大便干燥;女性患者中有 33 例同时有月经不调,以经期后错、痛经为多,有 12 例发疹与使用化妆品有关,多数患者舌质红绛舌苔厚腻,脉象弦滑。

治疗方法 治疗组采用中药方剂口服,组成:金银花 15g 野菊花 15g 黄芩 10g 生栀子 10g 桑白皮 15g 地骨皮 15g 全瓜蒌 15g 制大黄 10g;男性患者加用生地、丹皮各 15g;女性患者加用香附、益母草各 10g。每日 1 剂水煎分 2 次服。局部外用复方硫黄洗剂(每晚温水洗脸后,将复方硫黄洗剂摇匀,涂抹于面部患处;次日晨起温水洗脸后,将复方硫黄洗剂剂的澄清液涂抹于患处),口服维生素 B₆20mg 每日 3 次。对照组口服维生素 B₆,外用硫黄洗剂,方法同治疗组。2

周为 1 个疗程,2 个疗程评定疗效。

结 果 (1)疗效评定标准:痊愈:经 2 个疗程治疗皮疹全部消退;下次月经来潮前无新疹再发。显效:经 2 个疗程治疗皮疹消退 70% 以上;下次月经来潮前偶有少量新疹发生。有效:经 2 个疗程治疗皮疹消退 50% 以上;下次月经来潮前仍不断有新疹发生。无效:经 2 个疗程治疗皮疹消退不足 50%;下次月经来潮前仍有多数皮疹发生。(2)结果:治疗组有 4 例未能坚持 2 个疗程,56 例中痊愈 16 例,显效 31 例,有效 9 例,全部有效,愈显率 83.9%;对照组 30 例痊愈 5 例,显效 10 例,有效 5 例,总有效率 66.7%,愈显率 50.0%。两组愈显率比较有显著性差异($P < 0.05$)。说明中药配合维生素 B₆ 口服及药物外洗,疗效较好。

讨 论 本组 90 例患者中多数舌苔厚腻,表示胃中湿热;53 例有大便燥结表现,乃肺胃湿热蕴蒸之象,另外女性患者中有 33 例有月经障碍的现象,因此我们认为痤疮的发生,主要是肺胃湿热,大便燥结,冲任不调,兼感毒邪有关。所用药中桑白皮、地骨皮、黄芩、生栀子清肺胃湿热,泻火除烦;金银花、野菊花清热解毒,全瓜蒌、制大黄清热导滞,润肠通便。对于男性患者加用生地、丹皮凉血活血;对女性患者加香附、益母草调和冲任。以上诸药共用,可达清热除湿,凉血解毒,调和冲任,通利大便的作用。

(收稿:1997—05—05 修回:1997—05—20)