

· 基层园地 ·

花蜡冰与 103 联合治疗 烧烫伤 13 318 例

河南郑县 54647 部队(河南 467100)

蒋朝新 程福明 伍世健 伍冬芹

自 1980 年以来,我部用自制花蜡冰与 103 联合治疗烧烫伤 13 318 例,改进烧伤的换药及护理,提高了止痛效果,有效地控制了创面的感染,对减少疤痕形成,促进创面的早日愈合收到了理想效果。现介绍如下。

临床资料 13 318 例烧伤患者均在本院住院治疗,其中男 7602 例,女 5716 例,其中军人 302 例,其余均为地方群众。新鲜创面 5514 例,感染创面 7804 例。年龄最大 75 岁,最小 6 个月。烧(烫)性质:火药伤 1303 例;火焰烧伤 1513 例;热水烫伤 4543 例;热油烫伤 1245 例;汽油烧伤 2454 例;强碱化学烧伤 2240 例。部位:头、面部 2702 例,胸背、腹部 2825 例,上肢、腕、手 3983 例,下肢、踝、足 3808 例。受伤面积(按新九分法测算):0.5%~15% 9018 例,16%~40% 4300 例,其中Ⅲ度烧伤最大面积为 40%。受伤深度(按三度四分法判定):单纯Ⅰ度创面 614 例,浅Ⅱ度创面 3124 例,深Ⅱ度 9022 例,Ⅲ度创面 558 例。其中新鲜创面 9251 例,感染创面 4067 例。(注:“新九分法”、“三度四分法”是参考河南省驻马店市陆军 159 烧伤专科医院的方法。)

治疗方法

1 花蜡冰:主要由花生油 5000g 医用白蜡 1000g 冰片 100g。103:鲜柿子叶 2500g 川花椒 500g 薄荷 2500g,45%酒精 10L 组成。

2 用药时各类创面均以暴露治疗,禁止包扎,一般创面常规消毒后可直接涂花蜡冰,污染创面用 1:5000 高锰酸钾液冲洗,无菌注射器穿刺吸尽水泡中液体,创面周围常规消毒后涂花蜡冰。对脓痂较厚、坏死组织和活组织交织在一起不易分离的创面,涂药应稀厚,以利托脓去腐。经涂花蜡冰治疗后创面进入修复中期(需 6~9 天),创面改喷 103,每日 2 次,直到创面愈合。对污染严重的大面积创面,应在基础麻醉下彻底清创,交替用药,直到结痂脱痂愈合。在治疗中有脱水指征者,按烧伤补液原则予以补液,有明显的全身感染症状者,可给予全身抗感染治疗。

结果

1 治愈标准 Ⅰ、Ⅱ度为表皮愈合,创面光滑有毛发生长,肤色正常。深Ⅱ度创面边缘蔓延愈合。Ⅲ度烧伤治疗 8~10 天创面已有肉芽组织新生,按常规给予植

皮后,皮瓣扩散愈合。

2 治疗结果 除 1604 例因烧(烫)伤后没有得到及时治疗,创面感染严重,愈合期延长,205 例Ⅲ度创面局部留有少量疤痕外,经过一个夏天后疤痕组织部分软化吸收,其余 11 714 例全部治愈,疗程最短 8 天,最长 33 天。

3 用药前后创面细菌培养结果 在 13 318 例中,有 7804 例用药前后进行了创面分泌物培养,其中 3212 例用药前后细菌培养均为阴性,另 4592 例用药前均有 1~4 种细菌,如绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、硝酸盐阴性杆菌、四联球菌等,用药后培养均为阴性。

讨论

1 止痛消炎效果好。皮肤烧(烫)伤后,人体外表保护屏障破坏,体液外渗,热毒内侵,产生不同程度的疼痛。药中冰片、川花椒、薄荷、柿子叶均有收敛、清凉、疏散风热、止痛止痒、活血化瘀、消炎生肌等功效,该药涂于创面,即可使创面形成保护层药膜,从而减少创面的体液流失,使创面局部代谢保持稳定,起到明显止痛抗感染作用。花椒有表面麻醉作用,临床观察用药 5~10min 即可止痛。

2 组织生肌修复快、疤痕少。冰片不仅抑制细菌生长,还有较强的杀菌作用。鲜柿子叶含有大量的维生素、黄酮甙、鞣质样物质,使创面尽快干燥,增加创面的抗菌能力。薄荷渗透力强,有兴奋末梢神经促使毛细血管的再生,加快肉芽组织的生长,为Ⅲ度烧伤创造了提前植皮机会。该药使坏死组织与活组织分离快,不但可缩短疗程,而且有减少疤痕挛缩,避免愈合后烧伤部位疤痕增生的优点。

(收稿:1997-07-21 修回:1997-12-05)

中药治疗卵巢过度刺激 综合征的初步探讨

山东省潍坊市妇幼保健院(山东 261011)

齐玲玲 芦丽萍

我院不孕不育门诊在 1993 年 1 月至 1996 年 11 月期间,用促性腺激素(HMG—HCG)联合促排卵治疗无排卵性月经、继发性闭经、多囊卵巢综合征等各种无排卵引起的不孕症患者 458 例,其中 30 例患者出现中度以上卵巢过度刺激综合征(OHSS),我们试用纯中药治疗 15 例,效果较好,现总结如下:

资料与方法

1 一般资料 本组 30 例,年龄 25~37 岁,平均 31 岁。其中无排卵性月经 12 例,月经周期均正常,平