

4. 邓铁涛, 郭振球. 中医诊断学. 第 1 版. 北京: 人民卫生出版社, 1987: 377.
5. 中国中西医结合学会活血化瘀专业委员会. 血瘀症诊断标准. 中西医结合杂志 1987; 7(3): 129—131.
6. 汤宗明, 姚龙华, 朱智慧. 脑卒中的中医分型及综合康复治疗. 中国康复医学杂志 1993; 8(4): 173—176.
7. 张燕华, 李春生, 鲍淑德, 等. 老年人腔隙性脑梗塞中医分型

与 CT 分析. 中国中西医结合杂志 1995; 15(8): 508.

8. Friedwald WT, Levy RL, Fredrickson DS. Estimation of the concentration of low density lipoprotein cholesterol in plasma without use preparative ultracentrifuge. Clin Chem 1972; 18: 499.

(收稿: 1997-10-12 修回: 1998-02-10)

复方鸡丁散维持治疗抗消化性溃疡复发 62 例

范成明

1994 年 6 月~1995 年 6 月, 笔者应用复方鸡丁散维持治疗抗消化性溃疡 (PU) 复发 62 例, 并与对照组比较, 效果满意, 现报道如下。

临床资料

全部病例均符合下列标准: (1) 经西咪替丁近期治疗, 临床症状消失, 内镜下溃疡愈合或红色或白色瘢痕期; (2) 血、尿常规, 肝、肾功能均正常; (3) 患者同意合作。

下列情况不列入观察对象: (1) 有胃手术史者; (2) 怀孕、哺乳期妇女或服药期间有可能怀孕者; (3) 有严重并发症如大出血、幽门梗阻。治疗组和对照组各 62 例。治疗组男 44 例, 女 18 例; 年龄 17~61 岁, 平均 42 岁; 十二指肠球部溃疡 (DU) 43 例, 胃溃疡 (GU) 16 例, 复合溃疡 3 例; 病程 6 个月~9 年, 平均 4.7 年。对照组男 45 例, 女 17 例; 年龄 17~60 岁, 平均 41 岁; DU 43 例, GU 17 例, 复合溃疡 2 例; 病程 1~9 年, 平均 4.6 年。

治疗方法

上述病例近期治疗结束后, 停用一切抗 PU 药物, 治疗组早、晚各服复方鸡丁散胶囊 3 粒 (复方鸡丁散的组成与配制方法: 按鸡蛋壳炭 6 份、生鸡内金 3 份、丁香 1 份的比例, 先选新鲜清洁鸡蛋壳煨成炭, 再按上述比例共研成细末, 装入胶囊备用, 每粒 1g), 6 个月后改为每晚服 4 粒, 持续 1 年。对照组服淀粉胶囊, 方法相同, 持续 1 年。全部病例均门诊治疗, 除嘱患者戒烟酒, 其余生活、工作不加限制。

结 果

疗效标准: (1) 凡随访中患者有上腹痛、反酸及上腹

不适等症状者均列为随访复发。(2) 凡随访中经胃镜复查镜下溃疡有改变者为内镜复发。DU: 治疗组 43 例, 随访复发 5 例 (12%), 内镜复发 7 例 (16%); 对照组 43 例, 随访复发 34 例 (79%), 内镜复发 37 例 (86%)。GU: 治疗组 16 例, 随访复发 1 例 (6%), 内镜复发 1 例 (6%); 对照组 17 例, 随访复发 13 例 (76%), 内镜复发 14 例 (82%)。复合溃疡: 治疗组 3 例, 随访复发 1 例, 内镜复发 1 例; 对照组 2 例全部复发。总复发率: 治疗组随访复发 7 例 (11%), 内镜复发 9 例 (15%); 对照组随访复发 49 例 (79%), 内镜复发 53 例 (85%)。对照组内镜复发 53 例中, 2 例不愿继续合作, 2 例大出血手术治疗 (复合溃疡、GU 各 1 例), 余 49 例重新给予西咪替丁治疗, 溃疡愈合后给予复方鸡丁散维持抗复发, 观察 10 个月~1 年, 随访复发 4 例 (8%), 同意胃镜复查的 38 例复发 5 例 (13%)。通过以上双盲对照随访 1~1.5 年的疗效表明: 治疗组内镜复发率 15%, 对照组为 85% ($P < 0.001$), 治疗组复发病例均在 1 年停药后, 对照组 10 个月内复发 59%。

讨 论

复方鸡丁散中鸡蛋壳炭能解除胃痛、制酸。生鸡内金含有多种胃激素, 可能有效地调节胃内分泌功能紊乱。丁香能改善胃粘膜血液循环, 刺激肠胃蠕动, 且服用方便、药源广、经济实惠, 无不良反应, 不失为经内科正规抗 PU 治疗后, 抗复发的一种有效措施。

(收稿: 1997-05-26 修回: 1998-01-17)