

子的游离及其所致的炎症有强烈的抑制作用,从而减轻了细胞免疫反应的损害作用⁽⁷⁾。(2)桂枝能抑制 IL-2 的产生,IL-2 是调节细胞和体液免疫的重要因子,它的抑制能大大减弱免疫反应的过程⁽⁸⁾。(3)桂枝对感染性及非感染性炎症均有显著的抑制作用⁽¹¹⁾。柴胡和桂枝对 PM 的良好治疗效果,为临床医师治疗该病提供了一种新的选择。

参 考 文 献

1. 吴文涛,储旭华,侯熙德.柯萨奇病毒诱发实验性多发性肌炎的初步研究.卒中与神经疾病 1996; 3(4):176—178.
2. 侯熙德,蔡昭,沈鸣九,等.多发性肌炎动物模型的研究.中国实验临床免疫学杂志 1993; 5(5):3.
3. 周志家,赵玉环,文端明.病毒感染的多发性肌炎.中华神经精神科杂志 1985; 18(6):325.
4. Yousef GE, Isenberg DA, Mowbray JF. Detection of enterovirus specific RNA sequences in muscle biopsy specimens from patients with adult onset myositis. Annals of the

- Rheumatic Diseases 1990;49:310—315.
5. Bowles NE, Dubowitz V, Sewry CA. Dermatomyositis, polymyositis, and coxsackie-B-virus infection. J Rheumatol 1987;3:1004.
6. Dalakas M. Polymyositis: Clinical, immunopathologic and therapeutic consideration. Clinical neuro-immunology course No 141 AAN 43rd meeting. Boston, 1991:73.
7. 江田昭英.汉方方剂的抗过敏作用.国外医学中医中药分册 1988; 10(5):55.
8. 吕秀凤,谢蜀生,朱洪荫,等.桂枝汤免疫抑制作用的实验研究.中西医结合杂志 1989;9(5):283—285.
9. 吴文涛,侯熙德.多发性肌炎与皮肤炎的实验室检查分析.临床神经病学杂志 1997;10(1):36.
10. 史玉泉,丁美修,姚景莉,等.实用神经病学.第 2 版.上海:上海科学技术出版社,1994:907.
11. 富杭育.桂枝汤的药理学研究.中药药理与临床 1989;5(1):9.

(收稿:1997-06-04 修回:1998-02-10)

二黄冲剂治疗鼻咽粘膜上皮间变 24 例

欧阳志¹ 李正元² 石达望²

鼻咽粘膜上皮的癌前病变,病理表现为鼻咽上皮细胞重度核异质或异常增生和化生(间变)。阻断或逆转鼻咽上皮间变,当可减少鼻咽癌的发生。我们于 1995 年 10 月~1997 年 8 月用二黄冲剂治疗鼻咽上皮间变 24 例,取得了较好效果。

临床资料 选择经病理检查证实的鼻咽上皮间变患者 44 例,随机分为两组。治疗组 24 例,男 14 例,女 10 例;年龄 26~58 岁,平均 38.8 岁;病程 1~18 个月,平均 6.6 个月;上皮间变 1 级(鼻咽粘膜上皮轻度或中度非典型增生)14 例,间变 2 级(鼻咽粘膜上皮重度非典型增生)10 例;鼻出血 18 例,颈淋巴结肿大 2 例,耳鸣耳闭塞 2 例,咽异物感 2 例。对照组 20 例,男 10 例,女 10 例;年龄 25~58 岁,平均 41.8 岁;病程 3~12 个月,平均 5.7 个月;上皮间变 1 级 12 例,间变 2 级 8 例;鼻出血 8 例,颈淋巴结肿大 6 例,耳鸣耳闭塞 4 例,咽异物感 2 例。两组资料无显著性差异,有可比性。

治疗方法 治疗组服用二黄冲剂(由黄连、黄芪、人参、生地、玄参、金银花、连翘、板蓝根、山豆根、牛蒡子、射干、桔梗组成,湖南省回春堂制药厂生产成瓶装颗粒剂,每克含生药 2.34g),每次 20g,每天 2 次;对照组服

鼻咽清毒剂(广州潘高寿制药厂生产,由野菊花、苍耳子、蛇泡勒、七叶一枝花、两面针、夏枯草、龙胆草、党参等药物组成),每次 20g,每天 2 次。两组疗程均为 2 个月,均未服其他药物。疗程结束后病理活检复查鼻咽上皮组织学变化。

结 果 疗效标准:显效:鼻咽上皮间变 2 级逆转为单纯增生和化生;有效:鼻咽上皮间变 2 级逆转为 1 级或 1 级逆转为单纯增生和化生;无效:鼻咽上皮间变无变化;恶化:鼻咽上皮间变加重或转化为癌。结果:治疗组 24 例,显效 6 例(25%),有效 14 例(59%),无效 2 例(8%),恶化 2 例(8%);对照组 20 例,显效 2 例(10%),有效 4 例(20%),无效 8 例(40%),恶化 6 例(30%);总有效率治疗组 84%,对照组 30%;两组疗效经 Ridit 分析,有显著性差异($P < 0.01$)。

体 会 鼻咽上皮间变是鼻咽癌癌前病变,中医学认为是正气亏虚,邪毒(EB 病毒等)入侵蕴结于鼻而成的正虚毒结症。二黄冲剂是以黄连黄芪为主组成的复方,方中黄连解毒祛邪消肿,黄芪补气扶正散结,人参大补元气,加金银花、板蓝根、山豆根、牛蒡子、射干、连翘、玄参等清热养阴、解毒消肿和抗病毒、抗肿瘤作用;诸药合用,使正气得补,邪毒得祛。

(收稿:1997-09-22 修回:1998-02-02)

1. 湖南省娄底地区人民医院(湖南 417000);2. 湖南省娄底地区卫生学校