

讨 论

慢性肾功能不全是临床常见的难治病症,透析疗法和肾脏移植虽给患者带来福音,但其昂贵的医疗费用,不少患者难以承担。慢性肾功能不全属中医“癃闭”、“关格”等范畴,其病机多以脾肾亏虚为本,湿浊内阻、瘀毒留滞为标,治疗应标本兼施。根据现代药理研究证明,肾衰宁方中太子参、冬虫夏草健脾益肾,有提高人体免疫功能的作用;红花、丹参、牛膝活血化瘀;大黄通腑泄浊,降低血 BUN、SCr 水平,改善患者氮质代谢,并对钙、磷代谢有调节作用^[3,4];炙甘草调和诸药,全方合用能有效改善和保护肾脏功能,延缓病情进展。

且副作用少,使用安全。

参 考 文 献

1. 陈灏珠主编. 内科学, 第 4 版. 北京: 人民卫生出版社, 1996: 511—512.
2. 钱桐荪主编. 肾脏病学, 第 2 版. 南京: 江苏科学技术出版社, 1990: 634—638.
3. 马 骏, 林善铤. 大黄治疗慢性肾功能衰竭作用机理探讨. 中国中西医结合杂志 1993; 13(9): 570—571.
4. 毕增祺, 郑法雷. 大黄灌肠治疗慢性肾功能衰竭氮平衡研究. 中西医结合杂志 1987; 7(1): 22—23.

(收稿: 1997-07-29 修回: 1998-04-20)

蚤休加抗痂药综合治疗淋巴结核溃疡 30 例

成兴华

1989 年 10 月~1996 年 10 月, 笔者用中草药蚤休加抗痂药综合治疗淋巴结核溃疡 30 例, 并与单纯抗痂药治疗 28 例作对照观察, 获得满意疗效, 现报告如下。

临床资料 58 例均系门诊患者, 参照《实用内科学》(上海第一医学院主编, 第 6 版, 北京: 人民卫生出版社, 1979: 192—193) 标准, 58 例均有溃疡形成并经久分泌脓液, OT 试验阳性或强阳性, 淋巴结针吸检验耐酸染色找到抗酸杆菌。58 例患者, 随机分为两组, 治疗组 30 例, 男 14 例, 女 16 例; 年龄 12.5~41 岁, 平均 16.2 岁; 病程 0.5~5.1 年, 平均 2.1 年; 其中颈淋巴结核 29 例, 腋窝淋巴结核 1 例; 溃疡最大直径 0.6~1.5cm, 平均 0.71cm; 单发 27 例, 多发 3 例。对照组 28 例, 男 11 例, 女 17 例; 年龄 11~39 岁, 平均 15.9 岁; 其中颈淋巴结核 27 例, 腋窝淋巴结核 1 例; 溃疡最大直径 0.5~1.6cm, 平均 0.69cm; 单发 25 例, 多发 3 例。两组资料无显著性差异。

治疗方法 治疗组用异烟肼 0.2~0.3g, 维生素 B₆ 10~20mg, 每天 1 次口服; 2% 普鲁卡因 3~5ml 加链霉素 0.25~0.5g, 行受累淋巴结(直径>2cm)和窦道周围封闭, 每周 1 次; 外敷蚤休(鲜品 8~10g 或干品 5~6g 捣碎, 用 20%~25% 淡酒浸制), 无需清创, 置于留孔(视溃疡面大小)的夹层纱布中外敷于肿大的淋巴结表面, 敷药干燥后随时用淡酒浸湿, 2~3 天换新药。淋巴结缩小, 分泌脓液停止, 停用蚤休外敷和链霉素封闭, 继续服用异烟肼和维生素 B₆ 10~12 周。对照组常规量口

服利福平、异烟肼、乙胺丁醇和维生素 B₆。3 周为 1 个疗程, 两组治疗 6 周观察自觉症状、淋巴结大小、分泌脓液多少和时间变化等。

结 果 (1) 疗效评定标准: 自觉症状明显好转, 受累淋巴结明显缩小(直径<1cm), 脓液分泌停止, 溃疡愈合为显效; 自觉症状减轻, 受累淋巴结有所缩小(直径<2cm), 脓液分泌减少, 溃疡部分愈合为有效; 症状体征无变化为无效。(2) 临床疗效: 治疗组 30 例, 显效 24 例(80%), 有效 4 例(13.3%), 无效 2 例(6.7%), 总有效率 93.3%。对照组 28 例, 显效 9 例(32.1%), 有效 4 例(14.3%), 无效 15 例(53.6%), 总有效率为 46.4%。两组比较, 治疗组疗效显著优于对照组($P<0.01$)。溃疡愈合时间: 治疗组为 20~41 天, 平均 38.5 天; 对照组为 38~63 天, 平均 58.3 天($P<0.01$)。

体 会 颈、腋窝淋巴结核中医称鼠疮, 多发生于儿童和青年, 治疗较为棘手。蚤休(*Paris polyphylla*) 为百合科植物, 多生长在南方山区, 其含甾体皂甙(蚤休甾)、酚性成分, 具有清热、解毒、止痛、消肿、散结、拔脓去腐之功, 所以治疗痂溃疡有效。加之用异烟肼行全身治疗和小剂量链霉素行局部封闭, 即能达到内外兼治之目的, 并明显地缩短治疗时间。另外, 由于药源丰富, 能显著降低治疗费用。不过, 蚤休有小毒, 直接外敷于皮肤会引起部分患者局部搔痒、水疱等。所以将药液置于夹层纱布中, 避免药液直接作用于皮肤, 让药液缓慢渗入皮肤并吸收, 未见毒性反应。酒精有影响肉芽生长之过, 故纱布留孔以利于肉芽生长。

(收稿: 1997-08-25 修回: 1998-03-25)