

表2 两组宫颈糜烂疗效比较 [例(%)]

| 组别 | 程度 | 例数 | 治愈 | 有效 | 无效 |
|----|----|----|-----------|----------|---------|
| 观察 | 轻度 | 11 | 11(100.0) | 0 | 0 |
| | 中度 | 25 | 22(88.0) | 2(8.0) | 1(4.0) |
| | 重度 | 14 | 10(71.4) | 2(14.3) | 2(14.3) |
| | 合计 | 50 | 43(86.0)* | 4(8.0) | 3(6.0) |
| 对照 | 轻度 | 12 | 11(91.6) | 1(8.3) | 0 |
| | 中度 | 23 | 17(73.9) | 4(17.4) | 2(8.7) |
| | 重度 | 15 | 6(40.0) | 7(46.7) | 2(13.3) |
| | 合计 | 50 | 34(68.0) | 12(24.0) | 4(8.0) |

注:与对照组同项目比较, * $P < 0.05$

2.2 两组带下疗效比较 治疗后观察组显效41例,有效9例,显效率82%,总有效率100%;对照组显效14例,有效20例,无效16例,显效率28%,总有效率68%,观察组带下疗效的显效率及总有效率均明显优于对照组($P < 0.01$)。

2.3 两组腰酸腹痛疗效比较 观察组43例,显效29例,有效14例,显效率67.4%,总有效率100%;对照组39例,显效6例,有效16例,无效17例,显效率15.4%,总有效率56.4%,观察组显效率及总有效率均明显优于对照组($P < 0.01$)。

讨 论

宫颈糜烂属中医“带下病”范畴。临床表现带下量多、色质异常并伴有全身症状。西医以局部治疗为主,

CO_2 激光是其中疗法之一,主要目的是使糜烂面上的柱状上皮坏死脱落,让新生的鳞状上皮覆盖生长修复⁽²⁾。但宫颈局部体征减轻或消失后,患者腰骶酸痛、下腹胀坠、白带异常等症状常仍存在。故笔者除用 CO_2 激光局部治疗外,对患者加用中医辨证用药。对脾肾两虚患者选用完带汤加减,方中党参、白术、淮山药、苍术、车前子健脾益气、升阳除湿,杜仲、菟丝子、金樱子、芡实、黑芥穗温补肾阳、固涩止带;对湿热蕴结患者选用止带方加减,方中黄柏、山栀子、银花、败酱草、茵陈清热除湿,赤芍、丹皮清热凉血,猪苓、泽泻、茯苓、车前子利水渗湿。中西医结合治疗宫颈糜烂通过调整人体的整体机能使患者局部与全身症状都得到相应的改善。本研究观察结果表明,中医辨证论治结合 CO_2 激光治疗宫颈糜烂确实比单纯 CO_2 激光治疗的效果好,值得临床推广应用。

参 考 文 献

- 洪家铁. 中西医临床妇科学. 北京: 中国中医药出版社, 1996: 114—115.
- 牛建昭. 现代中西医妇科学. 北京: 中国科学技术出版社, 1996: 225.

(收稿:1997-12-22 修回:1998-05-28)

中药敷脐治疗妊娠剧烈呕吐 40例

郭莲萍 姚丽艳 王登兰

妊娠剧烈呕吐(剧吐)是孕妇早期出现的严重恶心,呕吐反应,常导致水、电解质紊乱。我院自1993年1月~1996年8月,用中药敷脐及静脉补液联合治疗妊娠剧吐40例,取得了满意效果,现报告如下。

临床资料 40例为我院住院患者。其中初产妇36例,经产妇4例,年龄22~33岁,平均27岁;停经40~96天,平均49天;病程3~35天,平均16天。尿酮体均阳性,其中尿酮体+++~++者26例。主要表现为停经后出现恶心,呕吐反应逐渐加重,不能进食,伴体重明显减轻,皮肤粘膜干燥,精神萎靡。

治疗方法 中药以健脾和中,降逆止呕为治则,组成:公丁香30g 陈皮30g 半夏20g,碾成细末,取鲜姜30g,切片加水煮,以鲜姜汁调和上述三味药呈稠糊状备用。常规消毒脐孔,取药糊饼4cm×4cm×1cm大小敷于脐孔上,外以纱布覆盖,胶布固定,每天换药1次,3~7天为1个疗程。用药期间辅以静脉补液,补充能量及纠正水、电解质紊乱。

结 果 40例患者经中药敷脐及补液联合治疗,3天治愈29例,5~7天治愈11例,尿酮体(-),平均治疗时间为4天,

总有效率达100%。在治疗过程中无1例发生不良反应,且疗效稳定,无副作用。

讨 论 妊娠剧吐中医又称之为妊娠恶阻,多由脾胃虚弱,胃气失于和降,反随冲气上逆,或肝胃不和引起胃失和降,冲脉之气上逆所致。严重时出现水、电解质紊乱,肝、肾功能受损,甚至威胁母子生命。治则多为健脾和中,降逆止呕。方剂药多味苦辛温,入脾、胃、肾、肺经及冲脉。它们的基本特点相同,生姜温胃止呕;半夏降逆止呕;陈皮理气健脾;公丁香温中降逆,治胃寒呕吐、呃逆及脾胃虚寒的少食腹泻。联合用药对妊娠剧吐有特殊效果。而脐在胚胎发育过程中,为腹壁最后闭合处,表皮角质层最薄,屏障功能最弱,且脐下无脂肪组织,皮肤和筋膜、腹膜直接相连,故渗透性强,利于药物穿透而被吸收。脐部有丰富的神经末梢和神经丛,对外部的刺激敏感,可以通过中枢神经系统迅速传达全身,以促进人体的神经体液调节作用和免疫机能,改善各组织器官的功能活动,达到治疗目的。该方法治疗妊娠剧吐用药时间短,方法简便,易学易用,孕妇无痛苦,患者乐于接受,且疗效稳定,无复发,对孕妇胎儿无不良影响,值得在临幊上推广使用。

(收稿:1998-07-29 修回:1998-11-11)