

120ml), 每次 20ml, 用药的方法同研究组。

所有研究对象在涂片前嘱 24~48h 内禁止性生活、阴道冲洗或局部用药, 不做双合诊检查, 阴道窥器不涂润滑剂等影响涂片检查效果。采用悬滴法, 直接取阴道分泌物涂片, 在显微镜下检查找到芽孢和假菌丝者为阳性, 反之为阴性。对确诊为白色念珠菌感染者方可用药, 用药 10 天为 1 个疗程。停药后第 5 天各行阴道分泌物涂片检查 1 次, 以后每次在月经干净后第 5 天复查阴道分泌物, 连查 2 次, 观察药物疗效及毒副反应。

结 果

1 疗效标准 治愈: 临床症状消失, 用药后经 3 次阴道分泌物涂片镜检均为阴性者; 有效: 症状消失, 前两次阴道分泌物涂片镜检至少 1 次阳性, 第 3 次为阴性者; 无效: 用药后仍有症状, 经 3 次阴道分泌物涂片镜检仍为阳性者。

2 结果 研究组治愈 38 例(76%), 有效 4 例(8%), 无效 8 例(16%), 总有效率为 84%; 对照组治愈 27 例(54%), 有效 11 例(22%), 无效 12 例(24%), 总有效率为 76%, 两组间总有效率比较无显著性差异($P>0.05$); 但两组间治愈率比较有显著性差异($P<0.01$)。两组病例经用药后观察无任何不良反应。

讨 论 槐白皮有抗菌、消炎及止痛作用, 该药无毒副反应, 特别对霉菌的生长繁殖有抑制作用, 经实验研究已证实, 10% 浓度的槐白皮药液即可抑制、杀灭霉菌。因此用槐白皮药物治疗妇女阴道炎痒痛亦与抗霉菌作用有关, 古人曾有用“槐白皮治疗诸疮肿”的记载(明·朱棣·普济方·北京: 人民卫生出版社, 1983: 655)。本研究用槐白皮治疗白色念珠菌性阴道炎患者 50 例, 经临床疗效观察, 消炎、消肿、止痛及止痒等疗效显著。对阴道壁有表浅溃疡的患者, 用药后溃疡面很快可以消失, 生肌效果较好。

(收稿: 1997-12-08 修回: 1998-06-02)

车前子纠正胎儿臀位的疗效观察

山东省乳山市人民医院妇产科(山东 264500) 姜宏芝

北京中医药大学东直门医院妇产科 魏惠珍

胎儿臀位是围产儿最常见的胎位异常, 自 1992 年 10 月~1997 年 10 月我们使用口服车前子纠正臀位, 并与胸膝卧位相对照, 取得满意疗效, 现报道如下。

临床资料 本组 84 例, 全部来源于我院妇产科门诊的初产妇, 经腹部 B 超及腹部检查, 确诊为单胎臀位。孕期 28~38 周的晚期妊娠者且均无骨盆畸形。随机分两组, 车前子组 52 例, 年龄 20~37 岁, 平均 26.93 岁。胸膝卧位组 32 例, 年龄 23~36 岁, 平均 26.92 岁, 以 B 超及产式验证转胎结果。

治疗方法 车前子组: 车前子 9g, 水淘洗去泥沙, 烘干研末, 茶杯内开水冲服, 晚睡前 1 次服下, 药后 7 天复查, 如未成功, 再服用 1 次, 服法同上, 14 天后统计疗效。服药后, 除小便略频, 胎动较活跃外, 无其他不适。

胸膝卧位组: 胸膝卧位, 每天 2~3 次, 每次 15min, 7 天为 1 个疗程, 2 个疗程后统计疗效。

结 果 (1) 胎位转正率: 车前子组 1 个疗程转正率

82.7%(43/52), 2 个疗程转正率 90.4%(47/52), 失败率 9.6%(5/52); 胸膝卧位组 1 个疗程转正率 75%(24/32), 2 个疗程转正率 81.3%(26/32), 失败率 18.7%(6/32)。经统计学处理, 两组无显著性差异($P>0.05$)。

(2) 孕周与转正率之间的关系: 车前子组孕 28~32 周转正率 94.3%(33/35)。孕 33~38 周转正率 82.4%(14/17); 胸膝卧位组孕 28~32 周转正率 87.5%(21/24), 孕 33~38 周转正率 62.5%(5/8)。结果显示孕 32 周前的转正率高于以后的转正率, 经统计学处理两组无显著性差异($P>0.05$)。

(3) 年龄与转正率的关系: 车前子组年龄 20~28 岁转正率 91.9%(34/37), 年龄 29~37 岁转正率 86.7%(13/15); 胸膝卧位组年龄 23~28 岁转正率 83.3%(20/24), 年龄 29~36 岁转正率 75.0%(6/8)。两组结果皆显示, 年龄在 28 岁以前转正率为高, 经统计学处理, 两组无显著性差异($P>0.05$)。

上述两种方法, 经 2 个疗程转胎失败者, 应试用外倒转术或其他疗法。全组在转胎治疗过程中, 未发生围产儿死亡, 孕妇也无其他合并症。

讨 论 臀位易致难产, 危及母婴的生命安全, 臀位转正治疗是围产医学的组成部分。中医胎位不正的病机为孕妇体质虚弱, 胞脉失养, 胎动无力, 治宜益气养血, 温补肾阳, 加强宫缩及胎动, 代表方药保产无忧散(十三太保方), 即宗上述治则化裁选方。《妇人良方》及《医林纂要》均有关于这方面的记载, 并推崇车前子是肝、肾、膀胱三经之要药。《中药大辞典》载车前子含有酸性车前聚糖、琥珀酸、腺嘌呤以及胆碱样多种化学物质, 故有兴奋胃肠道及子宫平滑肌的作用, 但车前子的转胎功能, 可能是多种化学物质的共同作用, 其机理尚需进一步探讨。

(收稿: 1998-08-14 修回: 1998-11-20)

中西医结合治疗老年革兰氏 阴性杆菌肺炎 50 例

山东省莱阳市莱城区人民医院(山东 271100)

董银德 张爱馨 沈 荣

1996 年 8 月~1998 年 1 月, 我们采用中西医结合方法治疗老年革兰氏阴性杆菌肺炎, 取得了满意的疗效, 现报告如下。

临床资料 99 例均系住院患者, 全部病例均依据[实用内科杂志 1989; 9(1): 19]有关革兰氏阴性杆菌肺炎临床诊断标准。随机分为中西医结合治疗组(治疗组)与西药对照(对照组)。治疗组 50 例, 男 31 例, 女 19 例; 年龄 46~81 岁, 平均 63.3 岁; 病程 20~70 天, 平均 45 天。50 例中属院内感染 29 例, 15 例有应用雾化吸入器治疗史, 14 例有应用糖皮质激素史, 46 例有应用抗生素史。50 例均做痰培养, 取痰符合标准, 并有两次以上为同一革兰氏阴性杆菌感染。对照组 49 例, 男 32 例, 女 17 例; 年龄 45~79 岁, 平均 62.0 岁; 病程 20~71 天, 平均 45.5 天。49 例中属院内感染 20 例, 14 例有应用雾化吸入器治疗史, 13 例有应用糖皮质激素史, 45 例有应用抗生素史。49 例均做痰培养, 两次以上为同一革兰氏阴性杆菌感染。两组临床资料无统计学差异, 具有可比性。