

固脱,同时结合西医采取紧急抢救措施。

两组患者均治疗 2 个疗程进行疗效判定。

结果 (1)疗效判定标准:根据 1979 年全国中西医结合治疗冠心病、心绞痛及心律失常座谈会的心绞痛和心电图疗效标准[医学研究通讯 1979;(12):17]判定疗效。(2)治疗结果:治疗组(心绞痛症状疗效)显效 32 例,有效 24 例,无效 4 例,对照组分别为 4、22 及 34 例,治疗组与对照组总有效率分别为 93.3%、43.3%。两组比较,经 χ^2 检验,有显著性差异($P < 0.01$)。

讨论 冠心病、心绞痛是中老年人常见的一种心血管疾病,此病属中医的“胸痹”、“心痛”、“真心痛”范畴。中医学认为本病为本虚标实证,本虚以阳气虚为主,标实以痰浊瘀血多见,阳虚则气化不利痰浊内生,故舌质紫暗、苔白腻或黄腻在反复发作心绞痛患者中多见。笔者采用“急则治其标、缓则治其本”的原则。在西医治疗基础上加以中医益气活血,化瘀通络,宣痹通阳。方中用黄芪、党参补益元气,丹参、川芎、赤芍、红花、郁金、元胡活血化瘀、通络止痛,瓜蒌、薤白、桂枝宣痹通阳,以改善心肌缺血,缓解心绞痛症状。从本组资料看,治疗组对各型心绞痛总有效率明显优于对照组,说明中西医结合治疗本病有很大实用价值,值得进一步探索。

(收稿:1998-12-01 修回:1999-06-20)

复方丹参注射液结合西药治疗老年单纯型慢性支气管炎 77 例

广东省南海市人民医院(广东 528200)

张晓虹 蒋 琪

近年来复方丹参注射液在临床的运用越来越广泛,根据它行气活血化瘀的药理特性及老年人红细胞变形性降低、机体血瘀证表现较明显的生理病理特点,从 1994 年 11 月~1997 年 4 月我们将该药用于老年单纯型慢性支气管炎的治疗,并与盐酸川芎嗪注射液及常规西药治疗组作对照,疗效显著,现报告如下。

临床资料 220 例患者均符合 1979 年全国慢性支气管炎临床专业会议修定的“慢性支气管炎临床诊断标准”[中华结核和呼吸杂志 1980;3(1):61],并有反复咳嗽、咳痰史,且近期症状加剧。随机分为 3 组:复方丹参注射液组(简称丹参组)77 例,男性 48 例,女性 29 例;年龄 44~95 岁,平均 72.6 岁;病程 4~38 年,平均 23.7 年;其中轻度 19 例,中度 30 例,重度 28 例;盐酸川芎嗪组(简称川芎嗪组)69 例,男性 41 例,女性 28 例;年龄 53~84 岁,平均 71.4 岁;病程 3~40 年,平均 19.8 年;其中轻度 14 例,中度 32 例,重度 23 例;常规西药治疗组(简称西药组)74 例,男性 43 例,女性 31 例;年龄 48~95 岁,平均 73.1 岁;病程 4~42 岁,平均 21.3 年;其中轻度 16 例,中度 34 例,重度 24 例。3 组病例在年龄、病程及轻重程度上无显著性差异($P > 0.05$)。

治疗方法 (1)西药组:选用先锋 VI 3.0g 或环丙沙星 0.2g 加入 5% 葡萄糖注射液 250ml 静脉滴注,每天 2 次。同时应用

祛痰、镇咳药物以改善症状;必要时配合气雾疗法稀化痰液,吸氧以减轻缺氧状态,改善心肺功能;根据临床情况调节水、电解质平衡;并对症治疗。(2)丹参组:采用复方丹参注射液(江苏东台制药厂生产,每支 2ml,每毫升含丹参、降香生药各 1g,批号:940822)16ml 加入 5% 葡萄糖注射液 250ml 中静脉滴注,每天 1 次,同时配合西药组的治疗方法。(3)川芎嗪组:以盐酸川芎嗪注射液(无锡制药七厂生产,每支 2ml,每毫升含生药 25mg,批号:9405291)150mg 加入 5% 葡萄糖注射液 250ml 静脉滴注,每天 1 次,同时配合西药组的治疗方法。3 组病例均以 7 天为 1 个疗程。共治疗 2 个疗程进行疗效判定。

结果

1 疗效标准 临床治愈:咳、痰症状好转九成以上,或症状不足轻度者;显效:咳、痰症状好转六成以上,或症状明显好转;有效:咳、痰症状好转三成以上,或症状有好转;无效:症状无改变,或好转不足三成者,以及症状加重者。

2 临床疗效 丹参组临床治愈 18 例,显效 24 例,有效 29 例,无效 6 例,显效率 54.55%,总有效率 92.21%;临床控制时间 3~65 天,平均 17.1 天;川芎嗪组临床治愈 16 例,显效 19 例,有效 29 例,无效 5 例,显效率 50.73%,总有效率 92.75%,临床控制时间 3~62 天,平均 18.27 天,西药组临床治愈 12 例;显效 15 例,有效 33 例,无效 14 例,显效率 36.49%,总有效率 81.08%,临床控制时间 3~79 天,平均 21.97 天。丹参组、川芎嗪组分别与西药组比较,显效率和总有效率均有显著性差异($P < 0.05$),而且临床控制时间明显缩短;丹参组和川芎嗪组比较,在显效率、总有效率及临床控制时间三方面均无显著性差异($P > 0.05$)。

讨论 老年单纯型慢性支气管炎临床非常多见。因为其反复发作,日久不愈,则必然导致机体诸脏亏虚,痰凝水停,气血瘀阻。因此,痰气交结,气滞血瘀是本病的基本病机,治疗应化痰顺气,活血化瘀。复方丹参注射液由丹参、降香提取物组成,具有行气活血化瘀的功效。能抗血小板凝集,扩张小动脉,改善机体诸脏器包括肺、支气管的微循环,促进慢性炎症的吸收,这说明本病采用复方丹参注射液的治疗有其充分的理论和科学依据。盐酸川芎嗪注射液对本病的治疗临床已有报道,由于两者在药理上的相似性,我们将其作为疗效参照组同时进行研究。通过对治疗结果数据的分析,我们发现两种治法都能在不同程度上提高疗效,因此值得临床推广应用。

(收稿:1999-03-31 修回:1999-05-20)

中西医结合治疗滴虫性阴道炎 124 例

湖北医科大学附属第一医院(武汉 430060)

熊素芳 李 鸣 龙 文 夏明珠

1997 年 3 月~1998 年 4 月,笔者在用西药的同时,采用中药煎剂阴道冲洗治疗滴虫性阴道炎 124 例,并与 96 例纯西药治疗组比较,疗效满意,现将结果报告如下。

临床资料