

操作简便, 创伤小, 疗效显著, 无不良反应, 最大限度保留生育机能的新方法; 既利用腹腔镜明确诊断, 直视下注药的优点, 又充分发挥了中药活血祛瘀、消癥止痛, 调和气血、整体治疗的长处, 确是中医学与现代科技相结合的产物。

### 参 考 文 献

1. 中国中西医结合学会妇产科专业委员会. 子宫内膜异位症、妊娠高血压综合征及女性不孕症的中西医结合诊疗标准. 中西医结合杂志 1991;11(6):376—379.

2. Zalel Y. Transvaginal sonographic measurements of postmenopausal ovarian volume as a possible detection of ovarian neoplasia. Acta Obstet Gynecol Scand 1996;75:668—671.
3. Sugimura K. MRI in predicting the response of ovarian endometriomas to hormone therapy. J. Comput Assist Tomogr 1996;20:145—150.
4. Faycz JA. Comparison of different treatment methods of endometriomas by laparoscopy. Obstet Gynecol 1991;78:660—665.

(收稿: 1999-03-01 修回: 1999-06-21)

## 双黄连粉针剂治疗呼吸系统感染 156 例疗效观察

李湘奇 王 莹

1997 年 6 月~1999 年 6 月, 笔者用双黄连粉针剂治疗呼吸系统感染 156 例, 取得显著疗效, 报告如下。

**临床资料** 206 例呼吸系统感染患者随机分为双黄连治疗组(治疗组)和头孢唑啉加病毒唑常规治疗组(对照组)。治疗组 156 例, 男 102 例, 女 54 例; 年龄 17~75 岁, 平均 43.2 岁; 上呼吸道感染 64 例, 急性支气管炎 46 例, 慢性支气管炎急性发作 32 例, 肺炎 14 例; 病程 1~6 天, 平均 3.6 天。对照组 50 例, 男 33 例, 女 17 例; 年龄 16~72 岁, 平均 41.6 岁; 上呼吸道感染 19 例, 急性支气管炎 14 例, 慢性支气管炎急性发作 11 例, 肺炎 6 例; 病程 1~7 天, 平均 3.8 天。两组患者临床表现: 体温在 37.5℃ 以上, 伴咽痛, 咳嗽, 喘息, 咽部充血; 肺部听诊可闻及干湿性罗音; 外周血白细胞总数或中性粒细胞升高, 或中性粒细胞与淋巴细胞比例倒置, X 线检查可见肺部片状阴影。两组患者资料比较无显著性差异( $P$  均  $>0.05$ ), 有可比性。

**治疗方法** 治疗组使用双黄连粉针剂(哈尔滨中药二厂)每天 60mg/kg 溶入 5% 或 10% 葡萄糖注射液 250ml 中静脉滴注(30~60 滴/min), 每日 1 次, 7 天为 1 疗程, 用药期间注意观察症状、体征、血常规及 X 线胸片变化, 并观察药物的毒副作用及适当对症处理。对照组使用常规剂量头孢唑啉钠(cefazolin)加入生理盐水 250ml 中静脉滴注, 病毒唑注射液按每天 10mg/kg 加入 5% 葡萄糖 250ml 中静脉滴注, 均每日 1 次, 7 天为 1 疗程, 并进行对症治疗。

### 结 果

**1 疗效判定标准** 体温恢复正常, 咳嗽、喘息等临床症状消失, 肺部听诊正常, 外周血中白细胞总数、中性粒细胞数恢复

正常, X 线胸片检查示肺部阴影吸收为痊愈; 体温正常, 咳嗽喘息减轻, 白细胞总数、中性粒细胞数恢复正常, X 线胸片检查, 肺部阴影大部分吸收为有效; 临床症状及体征无明显改善或临床出现并发症, 白细胞总数、分类及 X 线胸片检查无改变为无效。

**2 疗效** 治疗 1 个疗程后, 治疗组 156 例痊愈 88 例(56.4%), 有效 60 例(38.5%), 无效 8 例(5.1%), 总有效率 94.9%; 对照组痊愈 20 例(40.0%), 有效 21 例(42.0%), 无效 9 例(18.0%), 总有效率 82.0%。两组比较, 治愈率及总有效率有显著性差异( $\chi^2 = 4.12, P < 0.05$  及  $\chi^2 = 8.24, P < 0.05$ ), 治疗组优于对照组。

**3 平均退热时间** 治疗组(2.08 ± 1.32)天, 对照组(3.65 ± 1.42)天, 治疗组明显优于对照组( $P < 0.05$ )。

**4 毒副作用** 治疗组出现皮疹 1 例, 余均未见毒副作用和不良反应。

**讨 论** 双黄连粉针剂为金银花、黄芩、连翘提取物制成的无菌粉剂, 具有表里双解, 气血两清之功效, 临床资料表明, 双黄连粉针剂不仅具有抗病毒和广谱抗菌双重作用, 而且有提高机体免疫力的功能, 是一种理想的标本兼治中药制剂。双黄连粉针剂治疗呼吸系统感染, 疗效显著, 无论治愈率还是总有效率均优于头孢唑啉加病毒唑对照组, 对于病毒或细菌感染引起的高热, 有良好的退热作用。双黄连粉针剂副作用小, 本组 156 例中, 只有 1 例在静脉滴注过程中出现皮疹。有资料显示, 双黄连粉针剂可导致过敏性休克、皮疹等反应, 所以在使用时, 应严密观察, 一旦发生过敏反应, 及时停药或给予抗组胺药物, 以防意外。

(收稿: 1999-08-20 修回: 1999-12-15)