

新生口服液组戒断症状明显缓解,不少吸毒者服用后能安静,全身疼痛、烦躁不安减少,第 3 日饮食增加,大便通畅,较美沙酮组恢复快,且渴求减少,与美沙酮组治疗后比较,有显著性差异($P < 0.05$, $P < 0.01$)。治疗停药 3 日后复查尿吗啡含量检测均阴性。

4 药物不良反应 两组治疗前后观察血象、肝、肾功能无异常;12 例心电图提示心肌缺血者,用新生口服液治疗后复查恢复正常。

讨 论

新生口服液属纯中药制品,含党参、延胡索、杜仲、白花蛇舌草等,有补气血,固本扶正、益精髓、强筋骨、补虚损、镇静、止痛、止咳及增强免疫功能等作用,临床除用于各种疼痛外,亦可用于鸦片、吗啡、海洛因、大麻成瘾者戒断时疼痛。本研究 424 例海洛因依赖者用新生口服液获得满意疗效,对早、中期者可单纯用此药物

脱毒,对重症者辅以其他脱毒药物均可达满意脱毒效果,与美沙酮国际公认治疗效果近似⁽³⁾,服用期间对全身疼痛、出汗、厌食、失眠改善明显。其效果与服法关系密切,戒断初期第 1~2 日必须坚持 4~6h 服药 1 次,控制症状发作,出院后或门诊尚可坚持服用维持。并能作为配合用药,以减少其他戒断药物剂量。本剂型简便、适合国际型包装,无任何毒副反应,可作为海洛因戒断脱毒药物,并适用于门诊治疗。

参 考 文 献

1. 沙丽君,朱 辉,刘泽源,等.盐酸二氢埃托啡治疗海洛因.新药与临床 1993;12:27—30.
2. 万文鹏,李建华,张锐敏,等.美沙酮替代递减法用于海洛因依赖者戒毒治疗的评估研究.中国药物依赖性通报 1993;1:19.

(收稿:1998-12-14 二次修回:1999-09-30)

中西医结合治疗扁平疣的疗效观察

王砚宁¹ 张 郁²

1996 年 3 月~1998 年 10 月,我们用中西医结合治疗多发性扁平疣 58 例,并与单纯中药和西药作对照,报告于下。

临床资料 根据赵辨主编《临床皮肤病学》(南京:江苏科技出版社,1993:267—268)和梁勇才主编《实用皮肤病诊疗全书》(北京:学苑出版社,1996:358)作为西医和中医辨证分型诊断标准,确诊为扁平疣患者 136 例,随机分为 3 组。中药组 36 例,男 14 例,女 22 例;年龄 13~39 岁,平均 24.5 岁;病程 2 个月~6 年,平均 1.41 年;疣体数目 30~500 个,平均 210 个;中医辨证为肝经火旺型 13 例,风热克表型 23 例。西药组 42 例,男 13 例,女 29 例;年龄 9~37 岁,平均 25.2 岁;病程 2 个月~5.5 年,平均 1.94 年;疣体数目 30~500 个,平均 240 个;肝经火旺型 18 例,风热克表型 24 例。中西医结合(中西医)组 58 例,男 21 例,女 37 例;年龄 10~40 岁,平均 26.6 岁;病程 4 个月~7 年,平均 2.3 年;疣体数目 30~700 个,平均 280 个;肝经火旺型 24 例,风热克表型 34 例。疣体主要分布于面部、双手背及前臂。

治疗方法 中药组用复方黄芪汤加味:黄芪 25g,连翘、藿香、佩兰、白术各 10g,扁豆、丹参、陈皮各 12g,板蓝根 20g,生甘草 6g。风热克表型加黄芩 20g,薏苡仁、土茯苓各 20g;肝经火旺型加炙黄芩 20g,党参 15g;发展快加夏枯草 15g;皮疹瘙痒加白鲜皮 15g;病程日久加生牡蛎 30g;面部及双上肢皮疹加桑叶 6g,桔梗 8g;下肢皮疹加牛膝 10g。每日 1 剂,水煎分 3 次饭后服。西药组用冻干注射用胸腺肽(北京京航制药厂生产,批号:

960105)10mg,肌肉注射,每日 1 次。中西医组综合上述两组治疗剂量及用法。3 组均治疗 2 周后观察疗效。统计学方法采用 χ^2 检验。

结 果 (1)疗效评定标准:皮损全部消退,仅留暂时性色素沉着为痊愈;皮损消退 80% 以上为显效;皮损消退 50%~80% 为有效;皮损消退不足 50% 或无明显变化为无效。(2)3 组患者疗效结果见表 1。痊愈、显效率中西医组疗效均优于中药、西药组($P < 0.05$, $P < 0.01$)。

表 1 3 组疗效比较 [例(%)]

组别	例数	痊愈	显效	有效	无效	总有效
中 药	36	12(33.3)	13(36.1)	4(11.1)	7(19.5)	29(80.6)
西 药	42	20(47.6)	9(21.4)	7(16.7)	6(14.3)	36(85.7)
中西医	58	47(81.0)*	6(10.3)*△	3(5.2)	2(3.4)	56(96.6)

注:与西药组比较, * $P < 0.01$;与中药组比较, △ $P < 0.05$

体 会 扁平疣是人类乳头瘤空泡病毒所致。中医辨证此病为肝经郁热,血燥聚结或脾弱痰湿阻络,发于皮肤所致。据此理论,我们采用用清热解毒、除湿散结的中药复方黄芪汤、加强了胸腺肽的治疗作用。方中连翘、板蓝根、夏枯草清热解毒、消痈散结、透热于外,使邪气转出气分而解;藿香、佩兰芳香化湿,理气和中,兼能解表;白术、陈皮、扁豆、甘草健脾渗湿、理气行滞,以助运化;薏苡仁甘淡导下,以渗泄湿热;丹参、党参活血、补血,与黄芪合用明显增强活血散结之功效,而且利用黄芪的透皮作用,改善表皮的营养状况,提高了胸腺肽刺激机体产生的 T 细胞亚群在表皮的数量,从而增强抗病毒能力,加快表皮组织的修复,使扁平疣消退。

(收稿:1999-01-04 修回:1999-08-10)