

新癬片治疗外耳道炎性疾病 68 例

蒋福山

2000 年 3~8 月,我们采用新癬片口服及外用治疗外耳道炎性疾病 68 例(73 耳),并与服用抗生素及局部用药治疗的 30 例(32 耳)对照比较,现报告如下。

临床资料 98 例均为门诊患者,按就诊顺序随机分为两组。治疗组 68 例(73 耳),男 45 例(49 耳),女 23 例(24 耳),年龄 16~54 岁,平均 35 岁,病程 5~7 天。对照组 30 例(32 耳),男 21 例(23 耳),女 9 例(9 耳),年龄 18~57 岁,平均 37.5 岁,病程 5~7 天。两组患者均为外耳道炎性疾病,主要表现为耳内肿痛、流水等。检查可见,外耳道皮肤糜烂或红肿、有分泌物,触压外耳时疼痛明显,耳膜完整。两组患者临床资料比较,差异无显著性,有可比性。

治疗方法 治疗组用新癬片(组成:三七、牛黄、九节茶、珍珠层粉,每片 0.32g,由厦门中药厂生产,批号 980615),每次 2~4 片,每天 3 次口服。同时在清洗(双氧水或生理盐水)患侧外耳道后,用新癬片 1~2 片研成粉末后直接吹入外耳道内,每天 1 次。下一次吹入新癬片粉末前清洗外耳道。对照组口服抗生素(先锋霉素 IV、环丙沙星或阿莫西林、罗红霉素),患耳点用环丙沙星耳剂或 3% 酚甘油,每天 3 次,两组均治疗 5~7 天

评定疗效。

结 果 (1)疗效标准 治愈:外耳道红肿消退、疼痛消失、干耳,皮肤恢复正常。显效:外耳道红肿明显好转、疼痛消失、皮肤稍潮红。好转:外耳道红肿好转、仍疼痛但减轻,耳道少许分泌物。无效:临床症状及体征改善不明显。(2)疗效 治疗组 68 例(73 耳),治愈 46 例(67.7%),显效 15 例(22%),好转 7 例,总有效率 100%。对照组 30 例(32 耳),治愈 14 例(46.7%),显效 10 例(33.3%),好转 6 例,总有效率 100%。两组比较差异无显著性($P>0.05$)。

体 会 外耳道的炎性疾病主要由细菌感染引起,多因自行挖耳或外伤,引起皮肤组织的损伤而继发细菌感染。临床表现为耳内肿胀、疼痛及流水,使用新癬片起到了与抗生素相同的效果,具有抗菌消炎作用,尤其局部应用效果更为理想,镇痛效果显著,其优点是避免了使用抗生素引起过敏反应和毒副作用的危险,使用安全,疗效可靠,提供了治疗外耳道疾病的一种新方法,值得推广。不足的是每次吹药之前,必须先行清洁,清洗外耳道后方可再吹入新癬片粉末,才能发挥较好的效果,并需在专科医生操作下施治效果理想。

(收稿 2000-08-30 修回 2001-06-12)

天津市第三医院耳鼻喉科(天津 300250)