

新癪片治疗会阴侧切术后发热肿胀痛 59 例

林惠敏 郝宗光

会阴侧切术后肿胀疼痛是产科常见症状,经常给产妇带来痛苦和生活不便,且术后一般给予抗生素以预防感染等处理。但部分患者仍不能缓解局部伤口疼痛等症状。近年来我们采用中成药新癪片与抗生素联合应用治疗 59 例,效果显著,现报道如下。

临床资料 全部病例选自 1998 年 1 月~2000 年 8 月,均为在我院产科住院期间会阴侧切术后局部刀口疼痛发热患者 116 例。临床表现:术后 1~4 天发热($38.1\sim 39.2^{\circ}\text{C}$),加局部红肿,中性白细胞升高($0.08\sim 0.09$)。随机分为两组,治疗组 59 例,年龄 22~34 岁,平均 25 岁;其中会阴侧切术 48 例,会阴正中切开术 5 例,阴道侧沟裂伤 6 例。对照组 57 例,年龄 23~34 岁,平均 26 岁;会阴侧切 49 例,会阴正中切开 4 例,阴道侧沟裂伤 4 例。两组资料比较,差异无显著性。

治疗方法 两组均在术后 24h 内选用同样有效抗生素抗感染治疗,治疗组在用抗生素的基础上给予新癪片(由九节茶、三七、牛黄、珍珠层粉组成,厦门中药厂生产,每片 0.32g),每次

3 片,每天 3 次,饭后口服。两组均在局部发热肿胀痛恢复正常 48h 后停药。

结 果 服用新癪片 4 天,两组疗效比较。治疗组 I 期愈合、体温正常 56 例,伤口肿胀消失 54 例,伤口疼痛消失 57 例,中性粒细胞恢复正常 55 例,对照组上述分别为 28 例、31 例、28 例及 29 例。两组比较,差异均有显著性($P<0.01$)。

讨 论 新癪片在临床治疗范围广,特别在妇产科会阴伤口发热肿痛有显著消炎、止痛、退热疗效。新癪片主要成分由九节茶、三七、牛黄、珍珠层粉组成。药理实验结果证明新癪片具有清热解毒、活血化痰、消炎止痛及退热作用,与抗生素联合应用比单用抗生素效果更好,而且新癪片治疗产后伤口炎症,可避免或减轻抗生素类对产妇、婴儿发生过敏反应或耳毒性不可逆耳聋的危险。总之,尽管术后合理应用抗生素预防感染,但对某些发热和切口肿胀痛明显的患者单用抗生素奏效拖延的时间比较长,通过加用新癪片联用抗生素对治疗产后伤口肿痛发热起效快,有效时间长,明显缩短病程。服用后且无毒性反应,临床值得推广应用。