

例(60.9%)轻度粘连或肥厚 18 例(39.1%),无重度粘连或肥厚病例。对照组无粘连肥厚 8 例(26.7%),轻度粘连或肥厚 18 例(60.0%),重度粘连或肥厚 4 例(13.3%)。两组胸膜改变程度比较差异有显著性($t=3.08, P<0.01$),说明治疗组在减轻胸膜粘连肥厚方面明显优于对照组。

2.4 胸腔穿刺抽液情况 治疗组有 2 例抽液(其中 1 例 1 次,1 例 2 次),对照组 5 例抽液(其中 1 例 1 次,3 例 2 次,1 例 3 次)。

2.5 肝功能检查结果 全部病例均在第 2、第 4 个疗程结束时检查肝功能,治疗组中未发现肝功能异常者,对照组有 4 例肝功能异常,用中西药合用治疗后均恢复正常。

2.6 远期疗效 两组患者在胸水完全吸收并经足量、联合、规则、全程抗结核药物治疗后,经 1~5 年的随访复查,治疗组无复发病例,对照组复发 3 例。

讨 论

结核性胸腔积液属中医学“悬饮”、“胁痛”、“胸痛”等范畴。其病多因正气不足,外感痼虫之邪,肺失宣

降,通调失职,胸阳不振,气机不利,脉络痹阻,津液失运,水液内停,积液成饮,郁久化热,水饮、瘀毒互结,停滞胸膜而成。治宜逐水蠲饮,宽胸散结,行气活血,化痰解毒。方中柴胡轻清升散,能透达少阳之邪,疏散气机之壅滞,黄芩苦以燥湿,寒能清热,尤善清上、中焦湿热,与柴胡配伍,一散一清,升清降浊,调和表里,既疏肝解郁畅达气机,又清泄内蕴之湿热;百部润肺止咳,杀虫抗痨;丹参活血化瘀,凉血消痈,养血安神,善治心胸疼痛;桃仁活血祛瘀,润肠通便,止咳化痰;半夏燥湿化痰,降逆止呕,消痞散结;全栝萎润肺化痰,利气宽胸,润肠通便,散结消肿;葶苈子泻肺平喘,利水消肿,善治胸腹积水;白芥子温肺祛痰,利气散结,通络止痛;皂角刺托毒排脓,活血消痈,枳壳行气消积,宽中除胀,化痰除痞。诸药合用共奏利水逐饮,行气活血,宽胸散结,化痰解毒之效。临床实践证明,中西医结合治疗要比单一使用西药治疗的治愈率高,可减轻或预防胸膜粘连肥厚,降低复发率,减少化疗药和激素的毒副作用。

(收稿 2000-09-17 修回 2001-03-20)

阴痒康洗剂治疗阴道炎 60 例

李伯群 罗凤萍 于真玲

1995 年 2 月~1997 年 8 月,我们用阴痒康洗剂治疗阴道炎 60 例,并与用洁尔阴治疗的 30 例作对照,现总结如下。

临床资料 按《中药新药临床研究指导原则》(第一辑,1993:250—254)诊断标准,排除全身性疾病引起的外阴瘙痒症、老年性阴道炎及附加其他药物治疗者。所有病例均来源于河南医科大学第二、三附属医院门诊及部分住院合并此症的患者,按就诊顺序随机分为两组。治疗组 60 例,年龄 2~59 岁,平均 31 岁,病程 2 天~3 个月,平均 20 天,病情程度:重度 52 例,中度 8 例,霉菌及滴虫性阴道炎各 30 例。对照组 30 例,年龄 19~55 岁,平均 28 岁,病程 7 天~3 个月,平均 18 天,病情程度:重度 26 例,中度 4 例,霉菌及滴虫性阴道炎各 15 例。两组患者资料比较差异无显著性($P>0.05$),具有可比性。

治疗方法 治疗组用阴痒康洗剂,方剂组成:苦参 30g,蛇床子 30g,黄柏 15g,花椒 12g,白矾 12g,用加水煎煮及提取的方法混合浓缩制成 10ml/支外用液。用法:用阴道窥器扩开阴道,用镊子挟棉球擦洗外阴及阴道内分泌物,然后再挟带线棉球浸阴痒康药液 10ml 塞入阴道顶端子宫颈口外部分,将线尾留在阴道口外,8~12h 后自行牵线拉出棉球,如患者自用,可睡前用温开水洗净外阴,然后按上法用食指将浸有阴痒康洗

剂的棉球顶入阴道深部,次晨牵线取出。对照组用成都恩威牌洁尔阴,用法:取 15ml 药液加水至 200ml 装入冲洗器内,将冲洗器喷头插入阴道,压缩瓶体,药液即冲入阴道,保留 5min 放出即可,两组均每天 1 次,疗程为 5 天。月经期及妊娠期停用,治疗期间忌房事,对方如有感染应同时治疗。

结果 (1)疗效评定按前述标准。(2)疗效:治疗组 60 例,治愈 41 例(68.3%),显效 7 例(11.7%),有效 10 例(16.7%),无效 2 例(3.3%),总有效率为 96.7%;对照组 30 例分别为 11 例(36.7%),10 例(33.3%),9 例(30.0%)及 70.0%。经 χ^2 检验治疗组疗效优于对照组($P<0.05$)。(3)副作用:治疗前后进行心、肝、肾功能检查,结果两组均未发现明显的毒副作用。局部外用均无刺激作用,也未引起过敏反应。

体会 目前临床治疗本病的外用洗剂,使用方法多为坐浴、阴道冲洗,而霉菌和滴虫易在阴道皱襞中隐存。上述方法使药汁在阴道内保留时间短,用具易污染,影响疗效,疗程较长。本方是根据临床 30 余年的经验方系统观察 360 例,其有效率已达 94.7% 的基础上又经剂型改革及使用方法的改进,使药液直接作用于全部阴道粘膜达 8~12h,使药物有效成份充分发挥作用,故达到了缩短疗程,提高疗效的目的。

(收稿 2000-09-16 第 2 次修回 2001-06-10)