

表 1 两组患者治疗前后心率情况测定结果比较 ($\bar{x} \pm s$)

组别	例数		基础心率(次/min)		24h 动态心电图
			晨休	就诊时	(次/24h)
治疗	32	治疗前	43.20±1.05	48.19±1.08	72823.26±1265.20
		治疗后	55.24±1.12*	59.78±1.46**	99254.46±1875.24**
		差 值	8.32±1.88 [△]	9.54±1.53 [△]	1154.46±75.22 [△]
对照	23	治疗前	44.22±1.02	48.32±1.18	76182.38±1124.16
		治疗后	51.56±1.16*	53.97±1.22*	90128.52±1265.26*
		差 值	7.46±1.20	8.38±1.23	986.46±92.42

注 :与本组治疗前比较 , * $P<0.05$, ** $P<0.01$;与对照组差值比较 , $\Delta P<0.05$

(心功能改善不足 1 级或恶化)8 例,总有效率为 75.0% ,对照组显效 2 例,有效 10 例,无效 11 例,总有效率为 52.2%。两组比较差异有显著性($P<0.05$) ,治疗组优于对照组。

5 副作用 两组患者于疗程结束后复查血常规、大小便常规、血糖、血脂、肝肾功能及血电解质均无明显变化。治疗组有 3 例患者服药后第 2 天出现轻微腹痛及腹泻 ,对照组 2 例出现轻微咽痛 ,均未予特殊处理即消失。无诱发快速心律失常现象。

讨 论

病态窦房结综合征其病理改变主要为冠心病、心肌病、心肌炎等引起窦房结功能障碍及其周围组织的炎症、缺血及纤维化 ,从而产生一系列心率失常和不同程度的血流动力学改变⁽¹⁾。本病呈持久性的脉来迟缓 ,且伴有促、结、代脉交替出现 ,临床常见眩晕 ,反复

短阵晕厥及黑朦、气短、心悸、心前区疼痛诸症 ,相当于中医学的“胸痹”、“心悸”、“厥心痛”等范畴。从中医辨证分析 ,其发病多由少阴心肾两脏阳气虚衰、气血寒滞、血脉滞涩不畅所致。通心络胶囊以人参为君药 ,大补元气 ,可以改善心脏功能 ,增加重要器官的血液灌注 ,配水蛭、全蝎、 虫、蜈蚣、蝉蜕等虫类药具有扩张冠状动脉、增加冠脉血流、改善微循环、降低心肌耗氧量、改善心肌供血、稳定心肌电活动及窦房结营养等作用 ,从而提高窦房结兴奋性、增加基础心率及心肌收缩力 ,心输出量增加 ,使脏器灌注不足得以改善 ,心功能得到改善 ,达到临床治疗的目的。

参 考 文 献

1. 武桂霞. 温阳增脉汤治疗病态窦房结综合征 98 例临床观察. 中医杂志 1995 36(4):218—219.
(收稿 2001-03-07 第 2 次修回 2001-07-28)

白茅根煎剂治疗甘露醇所致的血尿 20 例

韩淑芳 庞莉莉

1997 年 6 月~2000 年 6 月 ,我们采用白茅根煎剂治疗甘露醇所致的血尿 20 例 ,现报道如下。

资料与方法 20 例患者均系本院住院患者 ,男 12 例 ,女 8 例 ,年龄 38~80 岁 ,平均 59 岁 ;其中经 CT 确诊为脑出血者 8 例(出血量为 18~45ml ,均有中线偏移) ,脑梗塞 12 例(梗塞面积均较大 ,均有明显中线偏移) ;12 例伴有不同程度的意识障碍 ,所有患者均有不同程度的头痛、呕吐 ,颈项强直 ,视乳头水肿等颅内压症状。入院时化验检查除 2 例有轻度肾功能异常外 ,其余肾功能均正常。根据病情静脉滴注 20% 甘露醇 125~250ml ,每 4~8h 1 次 ,所选病例均在用甘露醇 2~5 天出现肉眼血尿。对症处理 ,原发病病情轻者停用甘露醇 ,改用甘油氯化钠 ,病情重者甘露醇减量并加用速尿静脉滴注 ,同时静脉滴注止血敏 3g 或止血芳酸 300ml ,用药 1~2 天血尿仍无改善 ,且血尿颜色深而均匀。神志昏迷者可排除由于导尿所致尿路损伤性血尿。

取白茅根 45g 加水 600ml ,文火煎 45min ,煎至 400ml 分两次服用。昏迷者通过插胃管鼻饲 ,每次鼻饲约 100ml ,分 4 次服

完 ,每日 1 剂 ,连续服用至停用甘露醇。

结 果 18 例患者用白茅根煎剂 24h 内尿液逐渐变清 ,至镜检红细胞消失。2 例患者服白茅根煎剂 48h 内尿液逐渐变清直至镜检红细胞消失 ,有效率为 100%。其中 9 例患者在未停用甘露醇的情况下饮用白茅根煎剂 ,在 24h 内镜检红细胞消失。

体 会 甘露醇为治疗脑血管意外所致高颅压症的不可缺少的药物 ,为高颅压症首选脱水剂 ,在出现血尿后停用或减量后部分患者可在 1~2 天内血尿消失 ,但仍有一部分患者在停药后血尿仍持续存在 ,应用其他止血药物无效 ,甚至可持续十余天 ,从而导致病情恶化 ,部分患者虽血尿自行缓解 ,但因停用或减量甘露醇出现病情反复 ,影响治疗效果及预后 ,临床医生对此颇为棘手。我们用白茅根煎剂治疗甘露醇所致的血尿收到了良好效果。虽然白茅根煎剂治疗甘露醇所致的血尿的机理尚不清楚 ,但确实能较好地解决在高颅压治疗过程中出现的甘露醇血尿问题。

(收稿 2001-08-24)