· 博士之窗 ·

抗纤复方对人 $\alpha_1(\text{I})$ 前胶原基因启动子活性的影响*

赵 钢[△] 张 斌 陈建杰 王灵台

内容提要 目的 探讨抗纤复方(AFC)对人 $\alpha_1(\text{I})$ 前胶原基因启动子活性的作用及其机制。方法 :以含人 $\alpha_1(\text{I})$ 前胶原基因上流 2.3kb ,0.8kb ,476bp ,173bp 启动子片段为研究靶序列 ,以氯霉素乙酰基转移酶(CAT)为报告基因 构建基因重组质粒 转染成纤维细胞(NIH3T3) ,建立稳定的 $\alpha_1(\text{I})$ 前胶原启动子转染细胞体系 用抗纤复方和(或)转移生长因子(TGF β_1)处理 NIH3T3 细胞 测定 CAT 活性。结果 (1)抗纤复方能够抑制 $\alpha_1(\text{I})$ 前胶原启动子报导基因质粒 phCAT-C $\alpha_1(\text{I})$ 2.3 ,phCAT-C $\alpha_1(\text{I})$ 0.8 ,phCAT-C $\alpha_1(\text{I})$ 0.4 的活性 不能抑制 $\alpha_1(\text{I})$ 前胶原启动子报导基因质粒 phCAT-C $\alpha_1(\text{I})$ 0.1 的活性 (2)TGF β_1 能促进 phCAT-C $\alpha_1(\text{I})$ 2.3 的活性 抗纤复方能拮抗 TGF β_1 这一促进作用。结论 抗纤复方能够作用于胶原 $\alpha_1(\text{I})$ 基因调控片段 抑制胶原合成。

关键词 抗纤复方 胶原 启动子 转移生长因子 β_1

Effect of Anti-fibrosis Compound on Activity of Human $\alpha_1(\text{I})$ Precollagen Gene Promoter ZHAO Gang , ZHANG Bin , CHEN Jian-jie , et al *Shuguang Hospital , Shanghai TCM University , Shanghai (200021)*

Objective : To study the effect of Anti-fibrosis Compound (AFC) on activity of human $\alpha_1(\text{I})$ precollagen gene promoter (PGP- α_1) and its mechanism. **Methods :** Segments containing phCAT-C $\alpha_1(\text{I})$ 2.3 ,phCAT-C $\alpha_1(\text{I})$ 0.8 ,phCAT-C $\alpha_1(\text{I})$ 0.4 and phCAT-C $\alpha_1(\text{I})$ 0.1 were taken as series of targets , and chloramphenicol acetyltransferase (CAT) as reporter gene , to construct gene recombination plasmid , transform into NIH3T3 , and make a stable PGP- α_1 transfection cell line. It was treated by AFC and/or transforming growth factor β_1 (TGF β_1) , and the CAT activity was assessed. **Results :** (1) AFC could inhibit the promoter phCAT-C $\alpha_1(\text{I})$ 2.3 ,phCAT-C $\alpha_1(\text{I})$ 0.8 ,phCAT-C $\alpha_1(\text{I})$ 0.4 activity , but showed no effect on phCAT-C $\alpha_1(\text{I})$ 0.1 activity. (2) TGF β_1 could promote the activity of phCAT-C $\alpha_1(\text{I})$ 2.3 , AFC could antagonize the promotion of TGF β_1 . **Conclusion :** AFC could specifically affect the collagen $\alpha_1(\text{I})$ gene regulation segment , inhibit the synthesis of collagen.

Key words Anti-fibrosis Compound , collagen , promoter , transforming growth factor β_1

有研究显示抗纤复具有抑制肝星形细胞(hepatic stellate cell , HSC)和肌成纤维样细胞(myofibroblast , MFB)生长 ,减少胶原蛋白沉积的抗肝纤维化作用⁽¹⁻³⁾ ,但其机制尚不清。本研究从基因调控等分子水平 ,研究抗纤复方对人 $\alpha_1(\text{I})$ 型前胶原基因启动子的调控作用 ,并探讨其机制。

材料和方法

1 药物的制备 中药抗纤复方由黄芪 15g 丹参 15g 紫河车 10g 郁金 15g 等药物组成。其无菌

制剂原液由上海中医药大学附属曙光医院制剂中心按既定工艺制备(1g/ml , pH5.9) ,用 DMEM 培养液将其稀释成 0.05、0.1、0.5mg/ml 溶液 ,供实验用⁽⁴⁾。

2 5'-末端上流依次欠失的 $\alpha_1(\text{I})$ 前胶原启动子报告基因重组质粒 含有 $\alpha_1(\text{I})$ 前胶原启动子 2.3kb (-2.3kb to +42bp) 片段质粒。pcDNA-hCOL(I) 2.3 (括号内数字是从转录点起始碱基数)⁽⁵⁾ ,由日本 Dr. I Ozaki 馈赠。重新构建的重组体所用载体为不含启动子 ,但含有 SV40 增强子、氯霉素乙酰基转移酶 (CAT) 报告基因的质粒 pCAT-Enhancer (promega) , 5'-末端上流依次欠失长度不同 $\alpha_1(\text{I})$ 前胶原启动子质粒 phCAT-C $\alpha_1(\text{I})$ 2.3 (-2.3kb ~ +42bp) , phCAT-C $\alpha_1(\text{I})$ 0.8 (-0.8kb ~ +42bp) , phCAT-C α_1

* 国家自然科学基金项目(No. 39670906)

上海中医药大学附属曙光医院(上海 200021)

[△]博士

(I) 0.4 (- 476bp ~ + 42bp), phCAT-C α_1 (I) 0.1 (- 173bp ~ + 42bp) 分别是以限制性内切酶 BamHI-HindIII、ThaI-HindIII、KpaI-HindIII、NotI-HindIII (Promega 公司) 酶切 2.3kb α_1 (I) 前胶原启动子片段 , 并与经相同酶切形成粘性末端的线性 pCAT-Enhancer 载体 , 经 T₄DNA 连接酶 (Promega 公司) 连接 , 连接混和物转染至感受态大肠杆菌 HB101 , 经氨苄青霉素抗性筛选后扩增阳性克隆 , 纯化重组质粒 (Qiagen plasmid mini kit) 酶切 , 序列测定鉴定。

3 细胞培养及稳定的 α_1 (I) 前胶原启动子转染细胞体系 (stable transfection) 的建立 NIH 3T3 细胞由日本细胞银行 (JCRB) 提供。细胞在 37℃ , 95% 空气 , 5% CO₂ 条件下 , 10% FCS , 10u/ml 青霉素 , 100 μ g/ml 庆大霉素 (GIBCO-BRL)。

NIH3T3 细胞 1 $\times$ 10⁵ 细胞/100ml 的浓度接种于培养皿 , 培养 24h 后 , 交换培养液 , 运用 DNA-磷酸钙共沉淀基因转染法⁽⁶⁾ 将质粒 phCAT-C α_1 (I) 2.3、phCAT-C α_1 (I) 0.8、phCAT-C α_1 (I) 0.4、phCAT-C α_1 (I) 0.1 分别导入 NIH3T3 细胞。利用质粒中含有药剂耐性基因 Neo , 在质粒导入 NIH3T3 细胞 12h 后 , 加入 500 μ g/ml 的 G418 (geneticin) 处理细胞 , 克隆出含有 α_1 (I) 前胶原启动子稳定转染细胞株 , 建立稳定的转染细胞体系。

4 细胞增殖分析 采用 MTT 分析法⁽⁷⁾。100 μ l NIH3T3 细胞悬浮液 (1 $\times$ 10⁴/ml) 接种于 96 孔培养板中 , 培养 24h 后 , 换用含有各种浓度的抗纤复方和空白对照组的培养液 , 37℃ 培养 , 培养后第 1、3、5 天时 , 分别行 MTT 分析 , 在分析中加入 20 μ l 5mg/ml 的 MTT (Sigma 公司) , 37℃ 培养 24h , 然后再加入 150 μ l 1:1 二甲亚砜 (dimethyl sulfoxide , DMSO) 酒精混合停止反应液 , 摇动 10min 后 , 用 CS-9350pv (shimadzu TOKYO , JAPAN) 分光光度计在波长 555nm 测定 OD。

5 CAT 活性测定 含有 α_1 (I) 前胶原启动子重组报导基因质粒 NIH3T3 细胞。5 $\times$ 10⁵ 细胞数接种于 10cm 培养器中 , 培养 6h 后 , 换上分别含有 0、0.05、0.1、0.5mg/ml 的抗纤复方及 0.5mg/ml 的抗纤复方和 (或) 2ng/ml TGF β_1 的 DMEM 培养液。处理培养 48h 后 , 用 PBS (-) 洗涤细胞 2 次 , 0.9ml 的 CAT 分解缓冲液 (Promega) 分解细胞 , 15 000 r/min , 离心 15min 取上清 , 测定蛋白含量 , 一定的蛋白量 , 用分解缓冲液调制成 200 μ l 溶液 , 然后加入 10 μ l 8mmol/L 的乙酰辅酶 A , 1 μ l 的 ¹⁴C 标记的氯霉素 (0.1 μ ci/ μ l) , 37℃ 温育 1h , 加入 0.9ml 乙酸乙酯 , 振荡 30s , 12 000r/min 离心 10min , 吸取上清 , 在真空下 , 使乙酸乙酯挥

发 , 然后 , 将反应物用 25 μ l 的乙酸乙酯复溶 , 在 25mm 薄层分析 (TLC) 硅胶板起点上加入复溶反应物 , 电吹风吹干样品 , 将 TLC 板放入含有 200ml 氯仿 : 甲酸 95 : 5 的 TLC 缸中 24min , 将 TLC 板曝光 X 片。CAT 的活性定量用 BAS2000 (FUJISU JAPAN) 测定分析。

实验至少重复 3 次 , 数据用 $\bar{x} \pm s$ 表示 , 用 t 检验作统计学分析。实验中用无启动 pCAT3-Enhancer 质粒作为阳性对照 , 质粒 pcDNA/CAT (日本 Dr. I Ozaki 馈赠) 作内对照。

结 果

1 基因重组质粒的鉴定 见图 1。基因重组质粒 phCAT-C α_1 (I) 2.3 经酶切鉴定正确。经测序 , 插入片段与 GENBANK (U06669) 报道的序列完全一致。

2 抗纤复方对 NIH3T3 细胞增殖的影响 见图 2。不同浓度的抗纤复方处理 NIH3T3 细胞 48h 以后 , 在显微镜下未看到抗纤复方对细胞毒性样作用 , 处理细胞 5 天后 , MTT 分析也表明抗纤复方处理对细胞增殖没有影响。

3 抗纤复方对人前胶原 α_1 (I) 启动子区域调控的影响 见图 3A、图 3B。抗纤复方能够浓度依存地抑制 phCAT-C α_1 (I) 2.3、phCAT-C α_1 (I) 0.8、phCAT-C α_1 (I) 0.4 启动子的活性 , 而在 phCAT-C α_1 (I) 0.1 中则未看到这种抑制效果。

4 抗纤复方对 TGF β_1 诱导的 phCAT-C α_1 (I) 2.3 活性的影响 见图 4A、图 4B。预试验显示 TGF β_1 诱导 phCAT-C α_1 (I) 2.3 的活性在 2ng/ml 达最大值 , 选择该浓度。在已转染该重组报导基因质粒的细胞中 , 加入 TGF β_1 同时加入 0.5mg/ml 的抗纤复方 , 显

A phCAT-C α_1 (I) 2.3 HincII 酶切结果
B DNA 标准分子量
图 1 phCAT-C α_1 (I) 2.3 HincII 酶切鉴定结果

示 TGFβ₁ 诱导 phCAT-Cα₁(I) 2.3 活性的作用受到明显抑制。

图 2 抗纤复方对 NIH3T3 细胞增殖的影响

图 3A 抗纤复方对 α₁(I) 前胶原启动子的活性的影响

万方数据

图 3B 抗纤复方对 α₁(I) 前胶原启动子活性的影响

注:与正常对照组比较, * P<0.01 浓度分别为 0.05、0.1、0.5mg/ml 的抗纤复方处理含有不同长度的 α₁(I) 前胶原启动子质粒, 抗纤复方能够抑制 α₁(I) 前胶原启动子质粒 phCAT-Cα₁(I) 2.3, phCAT-Cα₁(I) 0.8, phCAT-Cα₁(I) 0.4 的活性, 不能抑制 phCAT-Cα₁(I) 0.1 的活性

图 4A 抗纤复方对 TGFβ₁ 激活 phCAT-Cα₁(I) 2.3 活性的抑制

图 4B 抗纤复方对 TGFβ₁ 激活 phCAT-Cα₁(I) 2.3 活性的抑制

注:与 TGFβ₁ 组比较, * P<0.01; 与正常对照组比较, Δ P<0.01

讨 论

HSC 是肝纤维化形成过程中合成胶原等细胞外基质(ECM)的主要细胞。 I 型胶原是纤维化时病变

部位沉积的主要胶原蛋白,其由两条 $\alpha_1(\text{I})$ 链与一条 $\alpha_2(\text{I})$ 链组成。这两种多肽链由不同基因编码。纤维化时 I 型胶原在病变部位的合成与沉积受多种因素影响。

研究表明抗纤复方能明显减少实验性肝纤维化大鼠总胶原和 I、III 型胶原的含量,对已形成的胶原亦有一定的溶解和吸收作用^(1~3)。

抗纤复方抗肝纤维化作用的机制,张斌等^(8,9)报道其能抑制 HSC 产生 $\text{TGF}\beta_1$, 阻断肝纤维化形成过程中肝星状细胞自分泌放大过程,减少胶原的产生。王皓等⁽¹⁰⁾则认为抗纤复方在翻译前水平影响胶原的产生。

笔者在启动子水平研究了抗纤复方对前胶原 $\alpha_1(\text{I})$ 启动子活性的作用。结果抗纤复方明显抑制该启动子的活性,提示抗纤复方在转录水平抑制 $\alpha_1(\text{I})$ 胶原的合成,这一结果支持王皓等抗纤复方在翻译前水平影响胶原产生的观点。

$\text{TGF}\beta_1$ 具有促进 HSC 增殖,并刺激 I 型胶原的合成,是肝纤维化发生时起重要作用的一个细胞因子,已被作为评价治疗肝纤维化疗效的指标之一⁽¹¹⁾。

在笔者的研究中,运用稳定的 $\alpha_1(\text{I})$ 前胶原启动子转染细胞体系,发现 $\text{TGF}\beta_1$ 在转录水平上调 $\alpha_1(\text{I})$ 前胶原启动子的活性。进一步的实验显示抗纤复方能拮抗 $\text{TGF}\beta_1$ 对 $\alpha_1(\text{I})$ 前胶原启动子活性的上调。提示抗纤复方对 $\alpha_1(\text{I})$ 前胶原启动子活性的抑制可能与这一拮抗作用有关。

$\alpha_1(\text{I})$ 前胶原表达调节机制已被广泛研究,许多因子参与了 $\alpha_1(\text{I})$ 前胶原启动子表达的调节。核酸因子如 AP-1⁽⁵⁾、SP-1⁽¹²⁾ 与 $\text{TGF}\beta_1$ 启动子相作用,增加或抑制 $\alpha_1(\text{I})$ 前胶原启动子活性。细胞因子如白细胞介素⁽¹³⁾、 $\text{TGF}\beta_1$ ⁽¹⁴⁾ 自身亦可调节 $\alpha_1(\text{I})$ 前胶原的表达。研究表明,上述诸多因子对 $\alpha_1(\text{I})$ 前胶原调节,都是通过影响启动子上流区域的应答部位而实现调节的。我们的研究表明,抗纤复方能抑制 pHCAT- $\text{C}\alpha_1(\text{I})$ 2.3、pHCAT- $\text{C}\alpha_1(\text{I})$ 0.8、pHCAT- $\text{C}\alpha_1(\text{I})$ 0.4 的活性,但是不能抑制 pHCAT- $\text{C}\alpha_1(\text{I})$ 0.1(-173bp ~ +42bp) 的活性,在 -476bp 到 -173bp 之间可能存有抗纤复方调控元件,抗纤复方是通过尚未知的机制,通过 -476bp 到 -173bp 区域调节 $\alpha_1(\text{I})$ 前胶原启动子活性,还需进一步研究抗纤复方的抑制机制。总之,抗纤复方抑制 $\alpha_1(\text{I})$ 前胶原的表达是通过抑制 $\alpha_1(\text{I})$ 前胶原 α_1 启动子活性实现的,其调控区域可能是在 $\alpha_1(\text{I})$ 前胶原启动子上流 -476bp 到 -173bp 之间。

参 考 文 献

- Ling Tai Wang, Bin Zhang, Jian Jie Chen. Effect of Anti-fibrosis compound prescription on collagen expression of hepatic cells of experimental liver fibrosis of rat. *World J Gastroenterol* 2000;12:877—880.
- 张斌,王灵台,陈建杰.抗纤复方影响大鼠肝贮脂细胞生成 I、III 型胶原的比较研究. *中国实验方剂学杂志* 2000;16(1):33—35.
- 王灵台,张斌,陈建杰.抗纤复方药物血清对肝纤维化大鼠肝细胞生成胶原的影响. *中华消化杂志* 1999;19(6):391—393.
- Miyamura M, Ono M, Kyotani S, et al. Effects of Sho-saikoto extracts on fibrosis and regeneration of the liver in rats. *J Pharmacol* 1998;50:97—105.
- Kiins J, Glick A, Sporn MB, et al. Characterization of the promoter region of the human transforming growth factor β_1 gene. *J Biol Chem* 1989;264:402—408.
- Oka H, Yamamoto S, Kuroki T, et al. Prospective study of chemoprevention of hepatocellular carcinoma with Sho-saikoto. *Cancer* 1995;76:743—749.
- Sladowski D, Steer SJ, Clothier, RH, et al. An improved MTT assay. *J Immunol Methods* 1993;157:203—207.
- 张斌,王灵台.抗纤复方对大鼠肝贮脂细胞产生转化生长因子 β_1 的影响. *胃肠病学和肝病杂志* 1999;8(1):16—18.
- 王灵台,张斌,陈建杰.抗纤复方对大鼠肝贮脂细胞表达 $\text{TGF}\beta_1$ 的影响. *中西医结合肝病杂志* 1999;9(1):21—23.
- 王皓,高春芳,孔宪涛.抗纤复方及 $\text{TGF}\beta_1$ 对胶原基因启动子活性的影响. *中国免疫学杂志* 1999;15(12):547—549.
- Imgaki Y, Truter S, Ramirez F. Transforming growth factor-beta stimulates alpha 2(I) collagen gene expression through a cis-acting element that contains Sp1-binding site. *J Biol Chem* 1994;269:14828—14834.
- Geiser AG, Busam KL, Kim SJ, et al. Regulation of the transforming growth factor-beta 1 and beta-3 promoters by transcription factor sp1. *Gene* 1993;129:223—228.
- Bristol LA, Ruscetti FW, Brody DT, et al. IL-1 alpha induces expression of active transforming growth factor beta in nonproliferating T cells via a post-transcriptional mechanism. *J Immunol* 1990;145:4108—4114.
- Van Obberghen-Schilling E, Roche NS, Flanders KC, et al. Transforming growth factor beta 1 positively regulates its own expression in normal and transformed cells. *J Biol Chem* 1988;263:7741—7746.

(收稿 2002-03-11 修回 2002-06-11)