

作用<sup>[7]</sup>。本研究发 现参附注射液对血液流变学参数有 明显改善作用是其发挥临床疗效的作用机制之一。有 研究发 现 85% 缺血性中风发生在 MCA 范围<sup>[8]</sup>, MCA 是能被超声探测的结构之一, TCD 检测颅内动脉的血 流动力学参数对缺血性中风血流动力学判断有肯定的 作用<sup>[9]</sup>, 灌注压不够, 血流缓慢是老年缺血性中风的重 要原因。本研究发 现参附液能明显改善梗死后患者 MCA 的血流动力学参数, 延长组织耐缺氧时间<sup>[10]</sup>, 并 具有抗脂质过氧化作用<sup>[11]</sup>, 从而明显改善老年脑梗死 患者的神经功能缺损评分和日常生活能力, 并且无不 良反应发生, 其疗效较对照组佳, 是治疗老年脑梗死安 全而有效的药物。

参 考 文 献

- 1 中华神经科学会. 各类脑血管疾病诊断要点. 中华神经科杂 志 1996;29(6):379—380.
- 2 陈清棠. 脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准及临 床疗效评分标准. 中华神经科杂志 1996;29(6):381—382.
- 3 金永娟. 血液流变学与中风预报. 中华血液学杂志 1991; (9):481—482.

- 4 Aeslid R, Narknald T, Monnes H, et al. Noninvasive transcranial Doppler ultrasound recording of flow velocity in cerebral arteries. J Neuroang 1982;57:769—770.
- 5 丘惠娟, 吴颖雅. 64 例脑梗死患者血液流变学测定数值分 析. 中国微循环 1997;(2):111—112.
- 6 赖直, 耿小茵, 王沙燕, 等. 中西医结合治疗对急性脑梗死 患者免疫功能影响. 中国中西医结合杂志 1999;19(1): 27—28.
- 7 王海, 张晶, 张莉. 参附液合并参麦液治疗充血性心 力衰竭临床观察. 现代中西医结合杂志 2001;10(20): 1937—1938.
- 8 Steven UB, Hussein RAZ, Boris V, et al. MCA flow asym- metry is a marker for cerebrovascular disease. Neurol Res 1996;18:163—167.
- 9 Stephan AM, Carole ET, Beverly ED. Asymmetry of in- tracranial hemodynamics as an indicator of mass effect in acute intracerebral hemorrhage. Stroke 1996;27:1788—1792.
- 10 吴树勋. 参附液对小鼠缺氧耐受研究. 中成药研究 1982; (6):32—34.
- 11 范金如. 参附液抗脂质过氧化作用研究. 中成药 1991;13 (2):27—28.

(收稿 2002-12-15 修回 2003-04-28)

· 病例报告 ·

鱼腥草注射液致过敏性紫癜 2 例报告

毛晓春

2002 年 1—4 月我们在临床工作中, 发现 2 例应用鱼腥草 注射液导致过敏性紫癜的患者, 现报告如下。

病例 1 患者女, 34 岁, 因咳嗽、发热、全身不适 3 天就诊。 查体: 体温 38.2℃, 脉搏 84 次/min, 呼吸 20 次/min, 血压 120/ 70mmHg, 咽红, 扁桃体 I 肿大; 双肺呼吸音粗, 未闻及罗音; 心 律齐, 未闻及杂音; 肝脾未触及; 双下肢无水肿, 无药物过敏史, 胸片、心电图正常。西医诊断: 上呼吸道感染, 中医诊断: 发热 证(风热犯肺型)。

治疗经过 予静脉滴注鱼腥草注射液 100ml/d。首次滴完 后 4h。患者双下肢远端伸侧出现稍突出于皮肤的出血性丘疹, 分批出现, 压之褪色, 丘疹双侧对称, 伴双下肢膝关节疼痛, 给 予 10% 葡萄糖糖钙 10ml 静脉推注, 强的松片 30mg/d 和息斯 敏片 10mg/d 口服抗过敏治疗, 3 天后紫癜基本消退, 1 周后完 全消失。

病例 2 患者男, 42 岁, 因咳嗽、咳黄痰、发热、胸闷 1 周就 诊。查体: 体温 37℃, 脉搏 80 次/min, 呼吸 24 次/min, 血压 110/65mmHg, 精神差, 咽部充血, 扁桃体无肿大。三凹征阴性,

双肺呼吸音粗, 未闻及干湿罗音; 心律齐, 未闻及杂音; 肝脾未 触及, 双下肢无浮肿, 无药物过敏史, 胸片示: 肺部感染, 心电图 正常, 血常规、血小板正常。西医诊断: 肺部感染, 中医诊断: 咳 嗽痰热郁肺型。

治疗经过 静脉滴注鱼腥草注射液 100ml/d。静脉滴注 36h 后四肢远端伸侧, 双侧对称性出现出血性斑丘疹, 隆起于皮 肤表面, 压之不褪色。给予 10% 葡萄糖糖钙 10ml 静脉注射, 强 的松片 30mg/d 口服, 扑尔敏片 25mg 每日 3 次口服抗过敏性 治疗, 1 周后皮疹完全消失。

体会 鱼腥草具有清热解毒、利湿排脓的作用。主治风 湿肺热证, 湿热证、痰热咳嗽等。鱼腥草注射液对多种炎性疾 病均具有良好的治疗效果, 正在受到中西医学界的重视, 临床 应用增多。笔者使用鱼腥草注射液引起 2 例过敏性紫癜, 应引 起临床足够重视, 在使用本品前, 应详细询问病史, 对过敏体质 者慎用。

(收稿 2003-03-20 修回 2003-05-15)