

床医药 2000 ;1(2):35—36.

Dong W, Zhang FG. Clinical observation on therapeutic effect of Mailuoning injection on cerebral infarction. Chin J Clin Med 2000 ;1(2):35—36.

3 Schwartz-Bloom RD, Mcdonough KJ, Chase PJ, et al. Long-term neuroprotection by benzodiazepine full versus partial agonists after transient cerebral ischemia in the gerbil. J Cereb Blood Flow Metab 1998 ;18(5):548—558.

4 包新民, 舒斯云. 大鼠脑立体定位图谱. 北京: 人民卫生出版社, 1991:40—49.

Bao XM, Shu SY. The stereotaxic atlas of the rat brain. Beijing: People's Medical Publishing House, 1991:40—49.

5 蔡文琴. 现代实用细胞与分子生物学实验技术. 北京: 人民军医出版社 2003:99—147.

Cai WQ. Modern practical cellular and molecular biological experimental techniques. Beijing: People's Military Medical Publisher 2003:99—147.

6 Siesjo Blc. Pathophysiology and treatment of focal cerebral is-

chemia. Part II: Mechanisms of damage and treatment. J Neurosurg 1992 ;77:337—354.

7 Hata R, Maeda K, Hermann D, et al Dynamics of regional brain metabolism and gene expression after middle cerebral artery occlusion in mice. J Cereb Blood Flow Metab 2000 ;20(2):306—315.

8 王殿俊, 赖尧基. “脉络宁”的药理和临床研究进展. 中国微循环 1997 ;8(1):48—50.

Wang DJ, Lai YJ. Development of Mailuoning on clinical and pharmacological researches. J Chin Microcirc 1997 ;8(1):48—50.

9 刘筱蔼, 吴伟康. 中药防治脑缺血再灌注损伤的研究. 中国中西医结合杂志 2001 ;21(10):794—798.

Liu XA, Wu WK. Researches on prevention and treatment of reperfusion injury in cerebral ischemia by Chinese herbal medicine. Chin J Integr Tradit West Med 2001 ;21(10):794—798.

(收稿 2004-01-14 修回 2004-06-28)

藿香正气软胶囊治疗动力障碍型功能性消化不良 30 例观察

陈 静

2003 年 1—9 月笔者采用藿香正气软胶囊治疗动力障碍型功能性消化不良 30 例, 取得良好的疗效. 现报告如下.

临床资料 按 1999 年制定的罗马 II 标准[中华医学会消化疾病分会胃肠动力学组. 我国消化不良的诊治流程和指南. 中华内科杂志 2000 ;10(39):717—718] 诊断功能性消化不良动力障碍型. 选用本院门诊患者 60 例, 随机分为两组, 治疗组 30 例, 男 16 例, 女 14 例, 年龄 24~45 岁, 平均(25.62±5.78)岁, 病程 6~46 个月, 平均(10.9±15.3)个月. 对照组 30 例, 男 15 例, 女 15 例, 年龄 23~44 岁, 平均(25.36±5.27)岁, 病程 6~48 个月, 平均(11.6±14.3)个月. 两组资料比较, 差异无显著性($P>0.05$).

治疗方法 治疗组采用藿香正气软胶囊(由天津达仁堂药厂生产, 每粒 450mg), 每次 2 粒, 每天 2 次口服; 对照组采用藿香正气滴丸(由天津天士力药厂生产, 每袋 2 500mg), 每次 1 袋, 每天 2 次口服. 所有患者 14 天为 1 个疗程, 治疗期间两组均停用任何其他治疗本病的中西药物. 观察治疗后 14 天主要症状改善情况. 统计学方法采用 χ^2 检验.

结 果

1 疗效判定标准 治愈: 主要症状消失; 好转: 主要症状

减轻; 无效: 主要症状未变甚至加重.

2 两组疗效比较 治疗组 30 例, 治愈 10 例, 好转 17 例, 无效 3 例, 总有效率 90%. 对照组 30 例, 治愈 5 例, 好转 3 例, 无效 6 例, 其余 16 例因无法耐受其强烈气味而中止治疗, 总有效率 26.67%. 两组疗效比较差异有显著性($P<0.05$).

讨 论 功能性消化不良是临床一种常见病, 包括上腹部疼痛、饱胀、嗝气、早饱、食欲不振、呕吐等临床症状, 属中医学胃痛、胃痛、呕吐等范畴. 中医学认为上述诸症的病理机制多为脾气虚弱、水湿不化、胃失和降, 即脾胃运化功能减退. 现代医学认为其发病机制复杂, 尚不能完全阐明, 但认为胃肠道运动障碍是引起功能性消化不良的主要原因, 胃电图检测显示动力障碍型功能性消化不良胃电缓慢节律或快速节律紊乱, 藿香正气软胶囊可以通过增强胃张力, 调整胃动力节律等多靶点药效作用, 改善胃蠕动, 而减轻诸症. 该方源自宋代《太平惠民和剂局方》“藿香正气散”. 方中藿香芳香化湿、调和脾胃, 紫苏醒脾胃化湿滞, 白芷下行肠胃除湿浊, 厚朴健脾燥湿, 宽中化滞, 大腹皮行气导滞、宽中除胀祛湿浊, 半夏、陈皮和胃, 降逆除恶心呕吐, 茯苓健脾和胃, 化湿利水, 以助脾胃的运化机能, 诸药协同, 共奏脾胃运化之功.

(收稿 2004-01-18 修回 2004-03-03)

作者单位 江苏省中医院(南京 210005)